

Высшие разовые и суточные дозы симнодействующих лека, средств для взрослых.

Наименование лекарственных средств	Высшие	
	Разовое	
<i>Acidum nicotinicum</i>	0,1 б	0,
<i>Aethacridini lactas</i>	0,05 б	0,15
<i>Aethaminalum natrium</i>	0,3 б	0,6
<i>Aether medicinalis</i>	0,33 мл (20 кап) б	1 мл (60 кап)
<i>Amidopyrinum</i>	0,5 б	2,0
<i>Anaesthesinum</i>	0,5 б	1,5
<i>Benzylpenicillinum kalium</i>	50000-300000 б/мл и н/к	200000 - 1500000
<i>Coffeinum natrii benzoas</i>	0,5 б 0,4 н/к	1,5 1,0
<i>Dibazolum</i>	0,05 б	0,15
<i>Dimedrolum</i>	0,1 б 0,05 б/мл	0,2 0,25
<i>Ephedrini hydrochloridum</i>	0,05 б и н/к	0,15
<i>Euphyllinum</i>	0,5 б б/мл 0,25 б/б	1,5 0,5
<i>Furacilinum</i>	0,1 б	0,5
<i>Furadoninum</i>	0,3 б	0,6
<i>Furazolidonum</i>	0,2 б	0,8
<i>Levomycesinum</i>	1,0 б	4,0
<i>Morsulfaxolum</i>	2,0 б	7,0
<i>Novocainum</i>	0,25 б 0,1 б/мл 0,05 б/б	0,75 0,1 0,1
<i>Oxacillinum natrium</i>	0,5 б	2,0 - 6,0
<i>Oxytetracyclini hydrochloridum</i>	0,5 б	2,0
<i>Papaverini hydrochloridum</i>	0,2 б н/к б/б 0,1 б/мл	0,6 0,3
<i>Phenobarbitalum</i>	0,2 б	0,5
<i>Phenoxymethylpenicillinum</i>	0,1 - 0,2 б	0,5 - 1,0

<i>Furacilinum</i>	0,1 б	0,5
<i>Furadoninum</i>	0,3 б	0,6
<i>Furaxolidonum</i>	0,2 б	0,8
<i>Gaeomyecetinum</i>	1,0 б	4,0
<i>Norsulfazolum</i>	2,0 б	7,0
<i>Novocainum</i>	0,25 б 0,1 б/мл 0,05 б/б	0,75 0,1 0,1
<i>Oxacillinum natrium</i>	0,5 б	2,0 - 6,0
<i>Oxytetracyclini hydrochloridum</i>	0,5 б	2,0
<i>Papaverini hydrochloridum</i>	0,2 б 1/4 1/6 0,1 б/мл	0,6 0,3
<i>Phenobarbitalum</i>	0,2 б	0,5
<i>Phenoxymethylpenicillinum</i>	0,1 - 0,2 б	0,5 - 1,0
<i>Phthalazolum</i>	2,0 б	7,0
<i>Pudnisololum</i>	0,015 б	0,1
<i>Reserpinum</i>	0,002 б	0,006
<i>Streptocidum</i>	2,0 б	7,0
<i>Streptomycini sulfas</i>	1,0 б/мл	2,0
<i>Sulfacylum natrium</i>	2,0 б	7,0
<i>Sulfadimexinum</i>	2,0 б	7,0
<i>Sulginum</i>	2,0 б	7,0
<i>Synoestrolum</i>	0,002 б б/мл	0,004
<i>Tabulettae Nitroglycerini 0,0005</i>	1,5 таб. пог. экв.	6 таб.
<i>Tetracyclinum</i>	0,5 б	2,0
<i>Vikasolum</i>	0,03 б 0,015 б/мл	0,06, 0,03

Во все не сорняк

Мокрица — кладоная микроэлементов и содержит в большом количестве разнообразных витаминов.

Настой травы снимает боль в сердце, желудочно-кишечные колики, восстанавливает нарушение обмена веществ, функцию печени после гепатита и при циррозе печени, избавляет от энтероколита и запоров в почтенном возрасте. Настой и сок мокрицы — хорошее отхаркивающее средство при легочной туберкулезе легких, бронхита, плеврита, ОРЗ, болеутоляющее при подагре и ревматизме, судорогах, хорошее мочегонное средство.

Наружно компрессы из мокрицы применяют при угрях, фурункулах, гемморое, опухолях, в виде ванн при полиартритах, растяжениях суставов, сытях, воспалении глаз, помутнении роговицы, носовых кровотечениях, отеках ног, нервном состоянии.

Из нее можно сделать простой поливитаминный салат, и поскольку мокрица не имеет специфич-

теплого вкуса и запаха салат обладает лишь вкусом добавляющий пряной зелени. Очень приятный.

На 3-4 порции салата; 100 гр. свежей травы мокрицы, 100 гр. зеленого лука, 20 гр. сметаны, 1 ст. л. уксуса. Все измельчить, посолить, посыпать укропом.

Настой; 1 ст. ложка свежей травы, залить 1 стаканом кипятка в термосе на 4 часа и пить по 1/4 стакана 3-4 раза в день.

Сок мокрицы; Отжать сок в соковыжималке и пить по 1 чайной ложке 3-4 раза в день 3-4 раза в день.

На зиму сок можно законсервировать; Угасить соком и 1 часть борща.

В сушеном виде мокрица теряет свои свойства. Регулярно употребляя это растение хотя бы по субботам и воскресеньям, к осени вы почувствуете, что мокрица совсем не злостный сорняк, а божий дар, который нужно прикипятить с благодарностью.

Специально
подготовленные звуковые
колебания
вызывает на море
магнетизм

Затем раз перчатки затвердевшие, то
на 15 минут в темноту. Нз. затем
различия и на 15 минут в темноту.
(40-50°) воду с 5% темноты. Перг.
тан. жидк.

Мед. шевки

Воду смешать с водой, затем
сметать до 2 дне. Помыть. Затем
быть без запаха, без резких запахов.
но 3-е воды от 50-100 частей.

4-е воды кожаная без. Хлорки, метал.
ассеу, без мер. запаха. Промывать
сразу и затем мед. воду. Выве
Затем шевки с мед. водой.
сметать 2 р. в день. Связь
затем на 1/3 банки. 40-50°

Мед. сок натур. 2-10°С.

Мед. 2-15°

Сыворотки + 3+10

Мед. шевки. 8-10

Мед. шевки полностью
на 7-10%. Облеп
шавку. Облепшар жидк.
шавку

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ ТРАВЫ

- 1) ПЛОДЫ ФЕНХЕЛЯ (отхаркивающее и ветрогонное)
- 2) ПЛОДЫ УКРОПА (при метеоризме и отхаркивающее)
- 3) ТРАВА ХВОЩА (мочегонное)
- 4) ~~ТРАВА СУШЕНИЦЫ ТОПЯНОЙ~~ (при повышенном артериальном давлении)
- 5) ~~СОПОДИЯ ОЛЬХИ~~ (вяжущее при хронических острых колитах и энтероколитах)
- 6) КОРА ДУБА (вяжущее при рожистости и кровотечениях десен)
- 7) ЦВЕТКИ БУЗИНЫ (потогонное и мочегонное)
- 8) ТРАВА ПАСТУШЬЕЙ СУМКИ (при маточных кровотечениях)
- 9) ТРАВА ПОЛЫНИ (перечь для возбуждения аппетита)
- 10) ПЛОДЫ ЖОСТЕРА, ЛИСТ СЕННЫ, (слабительное)

сок канцеляр.
сок картоф.
девелопе
фитомин
Бедина
трансева
1 x 2 p. 17 / 1967

2ст. ч. селу и вна расберет в му
жамъ и в. кимеко, кимеко
В ми в му. каст, оурунъ, крвину
не снмаша, тоооо, мелинъ не обм
отвар вимнъ вее за 20-30 м за ~~го~~
в тем. вие го завтра

Яблоки молодят

Ученые выяснили, насколько молодят яблоки. Они пришли к выводу, что благодаря им организм омолаживается на 17 лет. Дело в полезном веществе эпикатехине полифеноле. Он улучшает циркуляцию крови, повышает иммунитет и способствует омоложению сердца.

У всех без исключения добровольцев, употреблявших яблоки, улучшилась эластичность сосудов. Обычно именно их затвердение вызывает различные болезни сердца. Также все они стали чувствовать себя гораздо лучше.





МЕНЯЮ

● 2-комн. кв. (1-7, 2 эт., солнечная сторона, балкон застеклен, счетчики на г/х воду, кафель, ж/д и др.) на трех-, четырехкомн. кв. (можно без ремонта, с долгами).

Т.: 3-41-08, 8-705-134-37-75.

● 2-комн. кв. на две 1-комн. кв.

А.: 1-13-19, т. 2-00-58.

● 2-комн. кв. на 1-комн. кв. ул. пл.

Т. 3-75-24.

● 2-комн. кв. ул. пл. (5-28) на две 1-комн. кв.

Т. 3-59-28.

● 2-комн. кв. ул. пл. (1 эт.) на 1-комн. кв. в 3 мкр. с доплатой (2-3 эт.) или продаж.

А.: 6-15-13, т. 3-36-80.

● 2-комн. кв. ул. пл. в п. Октябрьском (по ул. Целинной) на квартиру в Лисаковске. Варианты.

Т.: 3-73-43, 8-777-972-62-65.

● 3-комн. кв. (2-7, 2 эт., балкон застеклен)

оренотропи
при инсульте
2007г.

Горень Аира

1 кор лот. без горки

на 1 см. Ход. вьрь

настоавать ковь

утром подогреть 1 литр

настоавать

ить по 1 ложке перед

ужин еда и по 1 ложке


1 литр (подогреть)

3 в 1 день и то 6 м.

настоавано.

Уважаемый пациент!

При наличии признаков диабетической полинейропатии (чувство покалывания, ползание мурашек, онемения, боли в ногах, руках, снижение чувствительности и т. д.) Вам следует обратиться к врачу-эндокринологу, невропатологу.



Гимнастика для ног

Каждый вечер отводите 15 минут для выполнения гимнастики для ног.

Каждое упражнение следует выполнять 10 раз.

Исходное положение: сесть, держа спину прямо, на стул или табуретку.

Упражнение 1

Пальцы ног поджать и снова распрямить.

Упражнение 2

Попеременно поднимать то носки, то пятки.

Упражнение 3

1. Ноги приподнять.
2. Совершать круговые движения носками ног.

Упражнение 4



Опираясь на носки, совершать круговые движения пятками.

Упражнение 5

(Каждой ногой выполнять упражнение 10 раз)
1. Выпрямить ногу в колене.
2. Поднять ногу параллельно полу.
3. Носок оттянуть.
4. Согнуть ногу в колене.
5. Ступню поставить на пол.

Упражнение 6

(Каждой ногой выполнять упражнение 10 раз)
1. Поднять ногу, выпрямив ее в колене, параллельно полу.
2. Потянуть носок на себя.
3. Опустить ногу на пол, опершись на пятку.



Упражнение 7

1. Повторить упражнение 6, проделав его обеими ногами одновременно.

Упражнение 8

1. Поднять, выпрямив колени, обе ноги.
2. Сгибать и разгибать стопы ног в голеностопных суставах.

Упражнение 9

(Каждой ногой выполнять упражнение 10 раз)

1. Поднять ногу, выпрямив ее в колене, параллельно полу.
2. Совершать стопой круговые движения (10 раз справа налево, 10 раз слева направо).

Упражнение 10

(Выполнить 1 раз)
1. Пальцами обеих ног смять одну страницу лежащей на полу газеты, потом разгладить ее, а затем разорвать на куски.
2. Куски газеты захватывать пальцами ног и перекладывать на вторую страницу газеты.

3. Затем эту страницу с разложенными на ней кусочками газеты скатать при помощи пальцев ног в шар.

Упражнения по Ратшоу

Улучшают кровообращение в ступнях и ногах.

1. Лечь на спину на кровати или гимнастическом мате.
2. Ноги поднять вверх, как можно больше выпрямив в коленях. Руками поддерживать ноги под коленями.
3. Совершать стопами круговые движения со скоростью один оборот за две секунды.
4. Выполнять круговые движения в течение 2 минут.

5. Сесть на край кровати и посидеть, свесив ноги, в течение 2 минут.

6. Попеременно повторять указанные действия в течение 20 минут.

7. По завершении упражнения немного походить по комнате.

8. В течение дня повторять эти упражнения несколько раз.

При возникновении боли выполнение упражнений надо прекратить и в последующем проконсультироваться со своим врачом.

ТВЕРДЫЙ СЫР ВМЕСТО ЙОДНОЙ СЕТКИ

Как можно избавиться от уплотнений, образовавшихся на ягодицах после уколов.

Кусочек тонко нарезанного пошехонского сыра на ночь прикрепить с помощью пластыря к больному месту, поверх - белье. К утру сверху сыр подсыхает, а та сторона, которая касалась тела, будет маслянистой. Применять в течение недели.

ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗРЕНИЯ ПОМОЖЕТ УКРОПНОЕ СЕМЯ

1 ч. л. истолченных семян на стакан кипятка, настаивать в теплом месте 15 минут и пить по 1/3 стакана в течение дня за 15 минут до еды.

ОТ БОЛИ В СУСТАВАХ

Смешайте по столовой ложке сухой горчицы, подсолнечного масла и меда. Томите смесь на водяной бане до получения однородной массы. Полученную мазь при сильных болях нанесите на больное место (лучше на ночь), сверху - целлофан и шерстяной платок. Утром компресс снимите.

Прежде чем использовать наши рецепты, посоветуйтесь с лечащим врачом.

КРАПИВА ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ

Если у вас радикулит или мышечная боль, смешайте в мясорубке листья крапивы со сливочным маслом, добавьте тертый хрен. Этот состав можно употреблять как мазь.

При нарывах, фурункулах смешайте листья крапивы с уксусом и водой в равных пропорциях. Смесь хорошо помогает прорваться нарывам.

Для улучшения работы сердца возьмите 5 ст. л. травы, залейте 0,5 л воды, кипятите на слабом огне и принимайте по полстакана 3 раза в день. Если неприятен вкус, подсластите напиток.

А для «мужской силы» заваривают семена крапивы - как чай и пьют за 30 минут до еды.

УНИВЕРСАЛ
ПЛАСТ

ОКНА, БАЛКОНЫ, ВХОДНЫЕ ГРУППЫ.

Замеры, доставка
БЕСПЛАТНО!

10-51, 8-701-550-64-33.

Сер-во ИП КС №010072, выданное 21. 06. 2000 г. Налоговым комитетом по г. Лисаковску

БЕСПЛАТНО
доставка по городу

Редакция газет

33,

“ФАРВАТЕР”



7% 6 месяцев
9% 9 месяцев
11% 12 месяцев
ГОДОВЫХ

г. Костанай,
тел. 54-34-52
г. Лисаковск,
тел. 3-36-53
г. Рудный,
тел. 9-50-54

Фирма “ЕР-ТАЛ”

ИЗГОТОВИТ
УТЕПЛЕННЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ДВЕРИ

от 26000 тенге

☎ **20-1-20,**
8-705-411-00-57.

Серия 07915 №0240526
от 16.01.2009 Рудницкий НК

Спасибо **VEKA**
за качествен
ОКНА



г. Рудный

ЕВ
г. Лисако

18. 02. 2010 г.

ЛЕТ

● **Письма
от наших читателей**

**СРЕДСТВО
ДЛЯ КОЖИ
ОТ РОЖИСТЫХ
ВОСПАЛЕНИЙ**

Спешу поделиться с читателями чудодейственным рецептом. Когда-то с его помощью я справилась с рожистым воспалением, а теперь он спасает от ран и кожных заболеваний всю нашу родню.

Взять 200 г оливкового масла, по 100 г смолы ели и пчелиного воска. Если смола сухая, ее нужно растереть в порошок. Все компоненты положить в кастрюлю и выдержать на водяной бане 10 минут. Затем добавить 2 ст. л. меда и еще варить 10 минут. Потом - 1-2 г прополиса и снова покипятить 10 минут. Состав все время перемешивать. Снять с огня, остудить, перелить в стеклянную банку. Хранить в холодильнике. Хочу сказать, что оливковое масло можно заменить нутряным свиным салом или свежим несоленым коровьим маслом. Добавлю, что мазь отлично помогает и при варикозном расширении вен.

К. Н.

18. 02. 2010 г.

ИЖА

Уважаемые работники малого и среднего бизнеса!

В городе Лисаковске идет работа по формированию Лисаковского филиала Общественного объединения «Профсоюз работников малого и среднего бизнеса».

Желающие вступить в профсоюзную организацию могут обратиться за справками по тел.: 3-44-56, сот. 8-705-452-23-54

**й юридических лиц,
февраль-март 2010 года**

	Местонахождение гос. органа, кабинет	Контактный телефон
г. г.	Лисаковский городской филиал партии "Нур Отан", здание ДК "Союз", каб. №63	4-04-19
		3-11-65

еплокотл се

№ 002044, сертификат соответствия № 0441

5°С, сосудов и трубопроводов,

БАЛЬЗАМ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА»

Бальзам «Золотая Звезда» изготавливается научным способом из вьетнамских высококачественных эфирных масел. Это средство приносит бодрость, ослабляет нервную напряженность и снимает усталость.

Состав:

— Масло корицы

— Гвоздичное масло

— Эвкалиптовое масло

— Мятное масло

и другие натуральные ароматические продукты с достаточным количеством вспомогательных веществ.

Показание:

Головная боль, головокружение, простуда, грипп, морская болезнь, насморк, укусы комаров и других насекомых, воспаление кожи, кожный зуд...

Способ употребления:

От головной боли, головокружения, простуды, гриппа — втирать бальзам «Золотая Звезда» в виски и затылок. В поездке для бодрости и утоления усталости предварительно вмазать в виски и ноздри. От укусов комаров и других насекомых — вмазать в место укуса и слегка натирать для быстрого результата.

МИНЭКСПОРТ

г. Ханой — ДСВ

"GOLDEN STAR" BALM

"Golden Star" Balm is prepared from first quality raw materials and natural essences of Viet Nam.

It refreshes mind, relaxes nerves and the body.

Composition - Cinnamon essence - Eucalyptus essence
 - Ocimum essence - Mint essence
 and other excipients.

Indications

Headache, vertigo, chill, influenza, cold, sea-sick, mosquitoes' bites and other insects' stings.

Directions for use

For headache, vertigo, chill, influenza, cold, sea-sick : rub the temples and nape with balm, also the nostrils.

For mosquitoes' bites and other insects' stings : rub the affected parts with balm for a quick result.

MINEXPORT HANOI

**Инструкция по применению
лекарственного средства для потребителей
(аннотация-вкладыш)**

ХОНДРОИТИН-АКОС

Торговое название

Хондроитин-АКОС

Международное непатентованное название

Хондроитин сульфат натрия

Лекарственная форма

мазь

Состав

100 г мази содержат:

Хондроитинсульфат – 5,0 г; диметилсульфоксид – 10,0 г; и другие вспомогательные вещества: ланолин безводный; вазелин медицинский; вода очищенная.

Описание

Мазь светло-желтого цвета с запахом диметилсульфоксида.

Фармакотерапевтическая группа

Регенерации стимулятор (M09AX02).

Фармакологические свойства

Действующим началом является хондроитинсульфат, получаемый из хрящевой ткани трахей крупного рогатого скота, который оказывает стимулирующее действие на регенерацию хрящевой ткани.

Уменьшает сопутствующее воспаление и ослабляет боль в пораженных суставах.

Показания к применению

Дегенеративные заболевания суставов и позвоночника: остеоартрозы, остеохондроз.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату.

Предупреждение

Следует избегать попадания препарата на слизистые оболочки и открытые раны.

Не использовать мазь «Хондроитин-АКОС» 5% без консультации врача при беременности и кормлении грудью, а также в детском возрасте.

Способ применения и дозы

НАРУЖНО!

Мазь «Хондроитин-АКОС» 5% наносится 2-3 раза в день на кожу над очагом поражения и втирается в течение 2-3 минут до полного впитывания. Обычно курс лечения составляет 2 недели. Если состояние не улучшится в течение 2-х недель, следует обратиться к врачу.

Побочные действия

В редких случаях возможны аллергические реакции, при этом препарат отменяют.

Форма выпуска

По 30,0 г. и 50,0 г в банках из стекломассы или алюминиевых тубах.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре от +2 до +20°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать препарат по истечении срока годности.

Отпуск из аптек

Отпускается без рецепта врача.

Производитель

Открытое акционерное общество «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (ОАО «Синтез»)

Российская Федерация, 640008, г. Курган, проспект Конституции, 7

ХОНДРОИТИН-АКОС ПРЕПАРАТЫН ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

(тұтынушыларға арналған ақпарат)

Сауда атауы

Хондроитин-АКОС

Халықаралық патенттелмеген атауы

хондроитин натрий сульфаты

Дәрілік түрі

жақпамай

Құрамы

100 г жақпамайда: хондроитинсульфат - 5,0 г; диметилсульфоксид - 10,0 г; және басқа қосалқы заттар - сусыз ланолин, медициналық вазелин, тазартылған су бар.

Сипаттамасы

Ақшыл-сары түсті диметилсульфоксид иісті жақпамай.

Фармакотерапиялық тобы

қайта қалпына келуін ширатушы (M09AX02).

Фармакологиялық қасиеттері

Ірі қара мал кеңірдегінің шеміршекті тіндерінен алынатын хондроитинсульфат бастапқы әсерлі зат болып табылады, ол шеміршекті тіннің қайта қалпына келуіне ширату әсерін тигізеді. Ілеспе қабынуды азайтып және зақымданған буындардағы ауруды басады.

Қолдану көрсетілімдері

Буындар мен омыртқаның бүліну ауруларында: остеоартроздар, остеохондроз.

Қарсы көрсетілімдері

Препаратқа жоғары сезімталдық.

Алдын-ала сақтандыру

Препаратты сілемейлі қабықтар мен ашық жарақаттарға тигізбеген жөн.

Бала жасындағыларға, жүктілік және емшек емізу кезінде 5% Хондроитин-АКОС жақпамайын дәрігердің кеңесінсіз қолданбау керек.

Қолдану тәсілі және мөлшерлер

СЫРТҚАІ

5% Хондроитин-АКОС жақпамайы күніне 2-3 реттен төрінің зақымданған ошағына жағылады да, сосын 2-3 минөт аралығында толық сіңілдірілгенше ысқыланады. Емдеу курсы, өдетте, 2 жұманы құрайды. 2 жұма аралығында әл-ахуал түзелмейтін болса, онда дәрігерге қараныңыз.

Жанама әсері

Сирек – аллергиялық реакциялар болуы мүмкін, бұл жағдайда препарат қабылдауын тоқтатады.

Шығарылу түрі

Шыны массасынан жасалған банкада немесе алюминдік сықпаларда 30,0 г және 50,0 г-нан.

Сақтау шарттары

+2-ден +20°C-ке дейінгі температура аралығында, жарықтан қорғалған, балалардың қолы жетпейтін жерде.

Жарамдылық мерзімі

3 жыл.

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін, қолдануға болмайды.

Дәріханалардан босатылу шарттары

Дәрігердің рецептісі қажет емес.

Өндіруші

«Синтез» медициналық препараттар мен бұйымдар

Акционерлік Қорған Қоғамы» ашық акционерлік қоғамы

Ресей Федерациясы, 640008, Қорған қаласы, Конституция даңғылы, 7.

Дәрілік заттың медицинада қолданылуы жөніндегі нұсқаулық ХОНДРОИТИН-АКОС

Саудалық атауы. Хондроитин-АКОС

Халықаралық патенттелмеген атауы. Жоқ

Дәрілік түрі. 5% сыртқа қолдануға арналған жақпамай

Құрамы. 100 г жақпамайдың құрамында: *бөлсенді заттар* - хондроитин натрий сульфаты (құрғақ затқа шаққанда) - 5,0 г; *қосымша заттар*: диметилсульфоксид, сусыз ланолин, медициналық вазелин, тазартылған су - 100,0 г-ге дейін.

Сипаттамасы. Диметилсульфоксидтің иісі бар ашық-сары түсті жақпамай

Фармакотерапиялық тобы. Тірек-қозғалыс аппарат ауруларын жергілікті емдеуге арналған басқадай препараттар
АТЖ коды M02AX

Фармакологиялық қасиеттері

Фармакокинетикасы. Іс жүзінде жүйелі түрде сіңбейді.

Фармакодинамикасы. Хондроитин-АКОС-тың құрамында хондроитин сульфаты бар - ірі қара малдың трахея шеміршегінен және диметилсульфоксидінен алынатын буындардағы шеміршек тіндерін қалпына келтіретін (хондропротектор) көтермелегіш.

Хондроитин сульфат жоғары молекуладағы мукополисахарид болып табылады, шеміршек тіндерінің бұзылу үдерістерін төмендетеді және оның қалпына келу үдерісін жылдамдатады. Шеміршек тіндерінің зақымдануын туғызатын ферменттерді бәсеңдетеді және деградациялануына кедергі болады; гликозаминогликан хондроциттер биосинтезін көтермелейді; буын қалтасының және буындардың шеміршек беткейінің қалпына келуіне ықпал етеді, буынішілік сұйықтығының өнімін арттырады. Фосфорлы-кальций алмасуын жақсартады және шеміршек тіндерінде кальцийдің жойылуын төмендетеді, сүйек тіндерінің сіңірілуін баяулатады, гиалин тіндеріндегі зат алмасуды қалпына келтіреді, қайта жаңғыру (қалпына келу) үдерісін жылдамдатады және шеміршек тіндерінің дегенерациясын (бұзылуын) төмендетеді. Құрылымы жағынан гепаринге жақын, синовиальды және субхондральды шағын айналым арнасындағы фибринді тромбтардың түзілуіне кедергі болады. Әсер етуінің нәтижесінде ауырғандық азаяды және зақымданған буындардың қозғалысы артады.

Жақпамайдың құрамына кіретін диметилсульфоксид қабынуға қарсы, ауырғанды басатын және фибринолитикалық әсерге ие, жасуша жарғақшалары арқылы тіндерге терең хондроитин сульфатының жеңіл өтуіне ықпал етеді.

Хондроитин-АКОС жақпамайы ауырғанды басатын және қабынуға қарсы әсері бар, зат алмасуын қалпына келтіреді және буын тіндерінің қайта қалпына келу үдерісін көтермелейді, буындардағы ауырудың азаюына және жойылуына, буындардағы қозғалыстың артуын және остеоартроздың және остеохондроздың өршуін баяулатады.

Қолданылуы: буындардың және омыртқалардың дегенеративті-дистрофиялық ауруларында (остеоартрозда, самалық-төменгі жасүйек буындарының остеоартрозында, спондилоартрозда, остеохондрозда, остеопорозда, хейроартропатияларда); сынуларда (сүйек шорының жылдам түзілуі үшін).

Қолдану тәсілі және дозалары. **СЫРТҚА!** Хондроитин-АКОС жақпамайын терінің зақымданған ошағына күніне 2-3 рет жағу және толық сіңгенге дейін 2-3 минут бойы сылап-сылау керек. Өдетте емдеу курсы 2-3 аптадан 2 айға дейінгі аралықты құрайды. Қажет болған жағдайда емдеу курсын қайталайды.

Жағымсыз әсерлері: аллергиялық реакциялар

Қолдануға болмайтын жағдайлар: препараттың құрамдас бөліктерінің қандай да біріне жоғары сезімталдықта; жара тұсындағы жедел қабыну үдерісінде; тіндердің жайылған некрозында (өлуінде); шамадан тыс грануляция пайда болғанда (жара бетінің орнында дәнекер тіндердің түзілуінде); жағатын жердегі тері жабындысының бүтіндігі бұзылғанда; жүктілік және лактацияда; 18 жасқа дейінгі балаларға.

Дәрілермен өзара әрекеттесуі. Буындардың және омыртқалардың дегенеративті ауруларын жалпы қабылданған сызба бойынша емдеуді қоса басқадай дәрілік заттармен емдеу аясында жақпамайды тағайындаған кезде жағымсыз дәрілік өзара әрекеттесуі анықталмаған.

Айрықша нұсқаулар. Жақпамайды шырышты қабыққа және ашық жараға түсірмеу керек.

Дәрілік заттың көлік құралдарын және қауіпті механизмдерді басқару қабілетіне әсер ету өрекшеліктері. Сипатталмаған.

Артық дозаланғанда. Анықталмаған

Шығарылу түрі және қаптамасы. Сыртқа қолдануға арналған жақпамай алюминийлі ықпаларда 30 г-ден. Өрбір ықпа қолдану жөніндегі нұсқаулықпен бірге картоннан жасалған пәшкеге салынған.

Сақтау шарттары. Жарықтан қорғалған жерде, + 2-ден + 20°С-ге дейінгі температурада сақтау керек. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

Сақтау мерзімі. 3 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолданбау керек.

Дәріханалардан босатылу шарттары. Рецептісіз.

Өндіруші

«Синтез» ААҚ

Ресей Федерациясы, 640008, Қорған қ-сы, Конституция д-лы, 7,
тел./факс (3522) 48-16-89

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства ХОНДРОИТИН-АКОС

Торговое название. Хондроитин-АКОС

Международное непатентованное название. Нет

Лекарственная форма. Мазь для наружного применения 5%

Состав. 100 г мази содержат: *активное вещество* - хондроитин сульфат натрия (в пересчете на сухое вещество) - 5,0 г; *вспомогательные вещества*: диметилсульфоксид, ланолин безводный, вазелин медицинский, вода очищенная - до 100,0 г.

Описание. Мазь светло-желтого цвета с запахом диметилсульфоксида.

Фармакотерапевтическая группа. Другие препараты для местного лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Код АТС M02AX

Фармакологические свойства

Фармакокинетика. Практически не обладает системной абсорбцией.

Фармакодинамика. Хондроитин-АКОС содержит хондроитин сульфат - стимулятор восстановления хрящевой ткани в суставах (хондропротектор), получаемый из хрящей трахеи крупного рогатого скота, и диметилсульфоксид.

Хондроитин сульфат является высокомолекулярным мукополисахаридом, тормозящим процессы разрушения хрящевой ткани и ускоряющим процессы ее восстановления. Подавляет ферменты, вызывающие поражение хрящевой ткани, и препятствует ее деградации; стимулирует биосинтез гликозаминогликанов хондроцитами; способствует восстановлению суставной сумки и хрящевых поверхностей суставов, увеличивает продукцию внутрисуставной жидкости. Улучшает фосфорно-кальциевый обмен и снижает потерю кальция в хрящевой ткани, замедляет резорбцию костной ткани, нормализует обмен веществ в гиалиновой ткани, ускоряет процессы регенерации (восстановления) и тормозит процессы дегенерации (разрушения) хрящевой ткани. Структурно близок к гепарину, препятствует образованию фибриновых тромбов в синовиальном и субхондральном микроциркуляторном русле. В результате воздействия уменьшается болезненность и увеличивается подвижность пораженных суставов. Диметилсульфоксид, входящий в состав мази, оказывает противовоспалительное, обезболивающее и фибринолитическое действие, способствует лучшему проникновению хондроитина сульфата через клеточные мембраны вглубь тканей.

Мазь Хондроитин-АКОС обладает обезболивающим и противовоспалительным действием, нормализует обмен веществ и стимулирует процессы восстановления в тканях суставов, приводит к уменьшению и исчезновению болезненности в суставах, увеличению подвижности суставов и к замедлению прогрессирования остеоартроза и остеохондроза.

Показания к применению: дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника (остеоартроз, остеоартроз височно-нижнечелюстного сустава, спондилоартроз, остеохондроз, остеопороз, хейроартропатии); переломы (для ускорения образования костной мозоли).

Способ применения и дозы. НАРУЖНО! Мазь Хондроитин-АКОС наносят 2-3 раза в день на кожу над очагом поражения и втирают в течение 2-3 минут до полного впитывания. Обычно курс лечения составляет от 2-3 недель до 2 месяцев. При необходимости курс лечения повторяют.

Побочные действия: аллергические реакции.

Противопоказания: гиперчувствительность к компонентам препарата; острые воспалительные процессы в области раны; распространенный некроз (омертвление) тканей; избыточные грануляции (образование соединительной ткани на месте раневой поверхности); нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого нанесения; беременность и лактация; детский возраст до 18 лет.

Лекарственные взаимодействия. Не установлено случаев негативного лекарственного взаимодействия при назначении мази на фоне терапии другими лекарственными средствами, включенными в общепринятые схемы лечения дегенеративных заболеваний суставов и позвоночника.

Особые указания. Следует избегать попадания мази на слизистые оболочки и открытые раны. *Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами.* Не описаны.

Передозировка. Не выявлена.

Форма выпуска и упаковка. Мазь для наружного применения по 30 г в тубах алюминиевых. Каждая туба вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

Условия хранения. Хранить в защищенном от света месте при температуре от + 2 до + 20°C. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения. 3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек. Без рецепта.

Производитель

ОАО «Синтез».

Российская Федерация, 640008, г. Курган, проспект Конституции, 7,
тел./факс (3522) 48-16-89

При варикозе и тромбофлебите
сухую ботву моркови: 1ст. л.
+ 200г. минерал. воды. настоять 1 час,
Жить по 200мл. 2-3р. в день.
(сжимать ботву в тещи)

1) Отвар ботвы моркови нужно пить
постоянно вместо чаю или воды
при всех варикозах и тромбофлебитах
2) Смешивать порокс. масса 400г. с
укрепителем 6%. (уменьшает расширение
вен.)

3) 1ст. л. шипов. хмеля + 200,0 воды и 15 мин
настаивать на водяной бане
Отвар пить 200,0 3р в день
можно смешивать с медом или
отваром прикладывая не порокс.
ткань на 10-15 минут
(с хмелем область свойством спонгиозной)

3) Физзарядка

4) Бутылку (или чашу) заполнить
цветами сирени берегов. порокс.
на $\frac{1}{3}$ и залить водкой

10 дней стоять, взбалтывая. не смешивать
пороксом, массу, пусть отгорит и снова
смешивать

Т.ч. 2007
- 45

ИНСТРУКЦИЯ
(информация для специалистов)
по медицинскому применению препарата
АЛФЛУТОП
(ALFLUTOP®)

Регистрационный номер: П N012210/01 от 09.07.2007 г.

Лекарственная форма: Раствор для инъекций

Активным компонентом препарата является биоактивный концентрат из мелкой морской рыбы (Килька (*Sprattus sprattus sprattus*), Мерланг черноморский (*Odontogadus merlangus euxinus*), Пузенок черноморский (*Alosa tanaica nordmanni*), Анчоус черноморский (*Engraulis encrassicholus ponticus*)), полученный путем экстракции с последующей депротеинизацией и делипидизацией.

Состав:

1 ампула емкостью 1 мл содержит:

Активное вещество: биоактивный концентрат 0,1 мл

Вспомогательные вещества: фенол (макс 0,005 г), вода для инъекций (до 1 мл).

Описание

Бесцветная или слегка коричневатого-желтого цвета, или слегка желтого цвета, прозрачная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: репарации тканей стимулятор природного происхождения.

Код АТХ: M09AX

Фармакологическое действие

Алфлутоп — хондропротектор, активным компонентом которого является биоактивный концентрат из мелкой морской рыбы. Концентрат содержит мукополисахариды (хондроитин сульфат), аминокислоты, пептиды, ионы натрия, калия, кальция, магния, железа, меди и цинка.

Алфлутоп предотвращает разрушение макромолекулярных структур нормальных тканей, стимулирует процессы восстановления в интерстициальной ткани и ткани суставного хряща, что объясняет его обезболивающее действие.

Противовоспалительное действие и регенерация тканей основаны на угнетении активности гиалуронидазы и нормализации биосинтеза гиалуроновой кислоты.

Оба эти эффекта синергичны и обуславливают активацию восстановительных процессов в тканях (в частности, восстановление структуры хряща).

Показания к применению

Алфлутоп применяют у взрослых при первичном и вторичном остеоартрозе различной локализации (коксартрозе, гонартрозе, артрозе мелких суставов), остеохондрозе и спондилезе.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Беременность и период лактации.

Детский возраст.

Предостережение

Не рекомендуется назначение препарата в юношеском возрасте из-за отсутствия научных клинических данных у этой категории пациентов.

Способ применения и дозы

При полиостеоартрозе и остеохондрозе препарат вводят глубоко внутримышечно по 1 мл в день. Курс лечения составляет 20 инъекций (по 1

инъекции в день в течение 20 дней).

При преимущественном поражении крупных суставов препарат вводят внутрисуставно по 1 – 2 мл в каждый сустав с интервалом 3 – 4 дня. Всего на курс 5 – 6 инъекций в каждый сустав.

Возможно сочетание внутрисуставного и внутримышечного методов введения.

Курс лечения целесообразно повторить через 6 месяцев после консультации врача.

Побочные действия

Редко наблюдаются зудящий дерматит, покраснение кожи и ощущение жжения в месте введения препарата, кратковременные миалгии. В отдельных случаях при внутрисуставных инъекциях возможно преходящее усиление болевого синдрома.

Очень редко возможно развитие анафилактических реакций.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

До настоящего времени не выявлены.

Передозировка

При передозировке у предрасположенных пациентов возможно возникновение аллергических реакций (иногда тяжелых).

Особые указания

В случае индивидуальной непереносимости морепродуктов (морская рыба) возрастает риск развития аллергических реакций.

Форма выпуска

Раствор для инъекций по 1 мл в ампулах из темного стекла с белым кольцом разлома.

По 5 ампул в контурной ячейковой полимерной упаковке без покрытия.

По 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

На каждую ампулу наклеивают этикетку.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре 15-25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать препарат с истекшим сроком годности.

Отпуск из аптек

По рецепту врача.

Биотехнос С.А.

ул. Думбрава Рошие 18, Бухарест, Румыния
18 Dumbrava Rosie str., Bucharest, Romania

Представитель производителя в РФ, уполномоченный на принятие претензий от потребителей:

ООО «Ромфарма»

119991, Москва, Ленинский пр-кт, д. 32 А

тел/факс: (495) 938-64-41

Алмагель®

суспензия

Almagel®

antacid

Торговое (патентованное) название препарата: АЛМАГЕЛЬ® (ALMAGEL®)

Международное (непатентованное) название (МНН): нет

Лекарственная форма: суспензия.

Состав:

Активные вещества: окись алюминия - 4,00%, окись магния - 1,38 %.

Вспомогательные вещества: сорбит, метилпарагидроксibenзоат, пропилпарагидроксibenзоат, этиловый спирт (1,8%), сахарин натрий, лимонное масло, гидроксипропилцеллюлоза, очищенная вода.

Описание: Алмагель® представляет собой суспензию белого или почти белого цвета с запахом лимона. При хранении на поверхности выделяется слой прозрачной жидкости. При энергичном взбалтывании флакона однородность суспензии восстанавливается. Смешивается с водой и спиртом.

Фармакотерапевтическая группа: Антацидное средство. АТС: А02АХ.

Фармакологические свойства: Алмагель® нейтрализует свободную соляную кислоту в желудке, что приводит к уменьшению переваривающей активности желудочного сока. Не вызывает вторичной гиперсекреции желудочного сока. Оказывает адсорбирующее и обволакивающее действие, уменьшает влияние повреждающих факторов на слизистую оболочку. Терапевтический эффект после приема препарата наступает через 3-5 минут и продолжается в среднем 70 минут.

Показания к применению: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения; острый гастрит; хронический гастрит с повышенной и нормальной секреторной функцией в фазе обострения; дуоденит; энтерит; грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, рефлюкс-эзофагит; функциональные расстройства кишечника, колит; дискомфорт и боли в эпигастрии при погрешности в диете, после употребления кофе, никотина, алкоголя; профилактически при лечении глюкокортикостероидами и нестероидными противовоспалительными препаратами.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, выраженное нарушение функции почек, болезнь Альцгеймера, беременность, ранний детский возраст (до 1 месяца).

Способ применения и дозы: ВНУТРЬ! По 1-3 дозировочные (чайные) ложки, в зависимости от остроты случая, 3-4 раза в сутки за полчаса до еды и вечером перед сном. При язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и некоторых формах язвенной болезни желудка (язва антрального отдела) можно принимать Алмагель® между основными приемами пищи. При достижении оптимального терапевтического эффекта рекомендуется поддерживающее лечение: по 1 дозировочной ложке 3-4 раза в сутки в течение 2-3 месяцев. Профилактически Алмагель® принимают в дозе 1-2 чайные ложки.

У детей препарат принимается строго по назначению врача: детям до 10 лет назначают по 1/3 дозы для взрослых, а детям с 10 до 15 лет - по 1/2 дозы для взрослых.

При заболелании, сопровождающемся тошнотой, рвотой и болями в животе, лечение начинают с Алмагеля А, а по исчезновении перечисленных симптомов переходят на прием Алмагеля.

Предупреждения:

- Интервал между приемом Алмагеля и других лекарственных средств должен составлять 1-2 часа.

- Не рекомендуется принимать препарат в дозах, превышающих 16 ложек в сутки, или, если применяют такую дозу, продолжительность курса лечения должна составлять не более 2 недель.

- При длительном приеме препарата следует обеспечить достаточное поступление с пищей фосфора.

- Перед приемом флакон следует взбалтывать!

Беременность и лактация: Не рекомендуется назначать Алмагель® дольши 3 дней при беременности. Избегать назначения кормящим матерям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: при одновременном применении Алмагель® может уменьшить терапевтический эффект антибиотиков тетрациклинового ряда, блокаторов гистаминовых H₂-рецепторов, гликозидов наперстянки, солей железа, ципрофлоксацина, фенотиазинов, изониазида, бета-адреноблокаторов, индометацина и кетоконазола.

Побочное действие: В отдельных случаях при приеме препарата могут возникнуть изменение вкусовых ощущений, тошнота, рвота, спазм желудка, боли в эпигастриальной области и запор, которые проходят после уменьшения дозы. При применении высоких доз может вызвать сонливость. Продолжительное лечение с применением высоких доз препарата и бедной фосфором еды может привести у предрасположенных пациентов к развитию дефицита фосфора в организме, повышенной резорбции и экскреции кальция с мочой и возникновению остеопении. Поэтому при длительном приеме препарата следует обеспечить достаточное поступление с пищей фосфора. У больных хронической недостаточностью почек, кроме остеопении, могут наблюдаться отеки конечностей, гемипарезы и гипермагниемия.

Форма выпуска: Суспензия в стеклянных или пластиковых флаконах по 170 мл.

Условия хранения: В сухом и защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Не допускать замерзания!

Срок годности: 2 года с даты производства.

Условия отпуска из аптеки: без рецепта.

Производитель: Балканфарма-Троян АД, Болгария, 5600 Троян, п. я. 82



Balkanpharma®
TROYAN AD

Алмагель®

суспензия

Almagel®

antacid

Саудалық /патенттелген/ атауы: АЛМАГЕЛЬ® – ALMAGEL®

Халықаралық /патенттелмеген/ атауы /ХПА/: жок.

Дерлік түрі: Суспензия.

Құрамы:

Белсенді заттар: Алюминий тотығы 4,00%, магний тотығы 1,38 %.

Қосымша заттар: сорбит, метилпарагидроксibenзоат, пропилпарагидроксibenзоат, бутилпарагидроксibenзоат, этил-спирті /1,8%/, сахарин натрий, лимон майы, гидроксизтилцеллолоза, тазартылған су.

Сыртқы көрінісі: Алмагель® ақ немесе аққа жақын түсті лимон иісті суспензия. Сақтау кезінде жоғары жағында мөлдір сұйық жиналған тұнба бөлінеді. Сауытты қатты шайқағанда суспензияның біркелкілігі қайта қалпына келеді. Сумен және спиртпен араласалы.

Фармакологиялық тобы: Антацидтік зат. АТС: A02AX.

Фармакологиялық қасиеті: Алмагель® асқазандағы бос тұз қышқылын бейтараптандырады. Соның салдарынан асқазан сөлінің ас қорыту белсенділігі азаяды. Асқазан сөлінің қайталап көп бөлінуін тудырмайды. Адсорбициялайтын және сыртынан қаптап алатын әсерге ие. Асқазан сөлінің асқазанның кілегей қабығын тітіркендіретін әсерін азайтады. Дәрінің емдік қасиеті дәріні ішкеннен 3-5 минуттан соң басталып, 70 минутқа дейін созылады.

Қолдану көрсеткіштері: Ұлтабар мен асқазанның ойық жарасының асқынған кезеңі; жедел пайда болған гастрит, асқазан сөлі көп немесе қалыпты бөлінетін созылмалы гастриттің асқынған кезеңі; дуоденит, энтерит; грыжа, рефлюкс-эзофагит, ішек жұмысының функционалды бұзылуы, ішектің шаншуы, ас қабылдау бұзылғандағы, /кофе, ішімдік ішкеннен кейін, никотиннің әсерінен/, қабынуға қарсы қолданылатын глюкокортикостероидтар және стероидты емес қабынуға қарсы заттармен емделгендегі дискомфорт және асқазан маңының ауыруы.

Кері әсерлері: Дәрінің құрамындағы жекеленген заттарға аса сезімталдық, бүйрек қызметінің ауыр бұзылуы, Альцгеймер ауыруы, сөбилік кезең/ жасы 1 айға толмаған сөбилерге/ қолдануға болмайды.

Қолдану тәсілі мен мөлшері: Ішуге! 1-3 шәй қасықпен, дерттің ауыр-жеңілдігіне байланысты, тәулігіне 3-4 рет астан жарты сағат бұрын және кешкісін ұйқырат алдында.

Ұлтабардың ойық жарасында және асқазанның түрлі ойық жараларында /антарлы бөліктің ойық жарасы/ Алмагельді негізгі ас қабылдайтын уақыттың аралығында ішеді. Тіпті емдік сөлшерге жеткеннен соң қолдаушы ем ұсынылады: мөлшерлеуші қасықпен 1 қасықтан тәулігіне 3-4 рет, 2-3 ай көлемінде.

Аурудың алдын алу үшін Алмагельді 1-2 шәй қасықтан қабылдайды.

Алмагельді балаларға қатаң дәрігердің тағайындауымен ғана қолданылады: 10 жасқа дейінгі балаларға ересектерге арналған мөлшердің 1/3-і, ал 10 жастан 15-жас аралығындағы балаларға 1/2 тағайындалады. Локсу, құсумен басталған ауруларда емдеуді алдымен Алмагель® А-дан бастап, аталған белгілер жойылғаннан кейін Алмагельге көшеді.

Ескертулер:

- Алмагель мен басқа дәрілерді қабылдау аралығы 1-2 сағат болуы керек.

- Алмагельді тәлігіне 16 қасықтан артық мөлшерде қабылдауға болмайды. Егер бұл мөлшерді қабылдаған жағдайда емдеу мерзімі 2 аптадан аспауы керек.

- Дәріні ұзақ уақыт қабылдағанда тағаммен бірге ағзаға фосфордың жеткілікті мөлшерде түсуін қамтамасыз ету керек.

- Дәріні ішер алдында сауытты шайқау қажет!

Жүктілік пен сүт бөліну кезеңі: Жүктілік кезеңінде Алмагельді 3 күннен артық уақыт қабылдауға болмайды. Бала емізіп жүрген әйелдерге тағайындауға болмайды.

Басқа дәрілік заттармен әсерлесуі: Алмагель® тетрациклин тобына жататын антибиотиктердің, гистаминдік Н-2 рецепторлардың құрсаушыларының, наперстанка гликозидтерінің, темір тұздарының, ципрофлоксацин, фенотиазиндердің, изониазидтің, бета-адренорецепторлардың, индометацин мен кетоконазолдың емдік әсерін төмендетеді.

Жаңама әсерлері: Дәрінің әсерінен жекеленген жағдайда әлсіздік сезудің өзгеруі, локусу, құсу, асқазан тырысып ауырғанда, асқазан маңының ауыруы, іштің қатуы сияқты дәрінің мөлшерін азайтқанда қайтатын белгілер. Дәрінің көп мөлшері ұйқыны келтіреді. Дәрінің көп мөлшерімен ұзақ уақыт емделгенде және құрамында фосфоры аз тағамдар ағзада фосфор жетіспеушілігіне әкеп соғады, кальций резорбциясы мен оның зәрмен бөлініп шығуын көбейтеді, остеопороздың пайда болуына әсер етеді. Аяқ-қолдың ісінуі, гипермагниемия, деменция болуы мүмкін.

Шығарылу түрі: Шыны немесе пластик сауыттарда 170 мл суспензия.

Сақтау шарттары: Құрғақ, жарық түспейтін, бөлме қызуы 25°C аспайтын жерде.

Қатып қалудан сақтау керек!

Жарамдылық мерзімі: Шығарылған күннен бастап 2 жыл.

Дәріханалардан босағу тәртібі: Ресепсіз.

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау істері жөніндегі агенттігінің 2001 жылғы

Өндіруші: Балканфарма-Троян АД, Болгария, 5600, гр. Троян, п. ж. 82

АДЕЛЬФАН-ЕЗИДРЕКС

Гипотензивный препарат, каждая таблетка содержит 0.1 мг резерпина + 10 мг дигидралазин и 10 мг гидрохлортиазид.

Адельфан-Езидрекс включает в себя три субстанции с различным воздействием, благодаря чему достигается потенциальный эффект.

Адельфан содержит резерпин и дигидралазин. Эти компоненты дают постепенное снижение кровяного давления. Третий активный компонент Езидрекс является осмодиуретиком, который равномерно снижает кровяное давление и усиливает воздействие других гипотензивных элементов.

Показания к применению

Адельфан-Езидрекс может быть использован при лечении всех форм гипертонической болезни, т.е. нестабильная и постоянная гипертония, при гипертонии почечного происхождения, гипертония, связанная с кардиальной гипертрофией или декомпенсацией, и гипертония при беременности.

Дозировка

Вначале принимают 1-2 таблетки 2-3 раза в день. Далее эта ежедневная доза часто может быть снижена. Для длительной терапии достаточно 2-3 таблетки в день.

Внимание: Адельфан-Езидрекс может применяться только под наблюдением врача.

Упаковка: Коробка по 10 табл. x 5 x 10 лент.

Компресс от Артроза.

В равных частях:

Ног медицинский 5%, нашатырный спирт 10%, мед (лучше цветной смальский) глицерин, пчел медун-ская. Все хорошо смешать и настаивать в теплом месте 10 дней.

Перед употреблением компресса, бутылку взболтать со смесью, отлить небольшое количество в другую небольшую бутылку и поставить её на водяную баню.

Пока смесь нагревается, приготовить марлевые салфетки смочить в 9-5 смой в смочить их в горячем растворе смеси. Этот компресс положить на ногу к больному суставу, обложить его сверху ватно-шерстяной тканью. Компресс делать ежедневно до исцеления.

телесно здоровел

300 гр спирта, 10 мл уксуса, 10 мл камфорного спирта и 10 таблеток анальгина. прикладывать к больному суставу, но предварительно смазать больное место детским кремом.

мазь от гангрены.

Все беруть по 50,0 гр.

1. Кони фоль
2. воск
3. мед
4. мыло хоз
5. с. мелену
(не солен
свинья соло)
6. м. растит.
(подсолн.)

Застывание
двигателя до 4-5 м. чек

Все" измѣнѣ, перее-
мать и прокинуть 180
Беннеръ / или / минута
контрабасъ /

Немного остынет, добавит
мук и жасмон (измельч.
но мелко) геркулесе
но SO_2O_2 .

Потом алоэ, тоже 500
тоже из мявзек. ивы.

Всё переписать.

Через темя, как пользоваться,
ту часть, которую будем обра-
ботывать. А ^{миску} обтирать, через темя,
как обраб., надо будет помазать
чистой сухой ложкой, т.к. эта
масса может расслабиться.
Хранить в холодильнике
Прикладывать 2р в день

Все берут по 50, 0

кашграв

воек

ноз мед

смазку

(несколько
свин
само)

мелко хоз.

и. раст

подска

защита

мелко

ч. 5 и ч. 6

изменил как

и прокинет

когда оеты не

никого + муфта 50

нагр. на мелк. Терм

Алод и жидко 50, 0

все передел

перел как пополь

разор на базе баше

и приклад. 2р. в день

2004

Читатель советует

Как "отделаться" от кисты и "успокоить" суставы?

У моей знакомой была киста на яичнике и фибромиома на матке (около 6 недель). Она пила утром натошак сок чистотела (1 ч. л. сока разводила в 50 г холодной кипяченой воды) и запивала 100 г молока. Принимала его 1 раз в сутки в течение 20 дней, затем 10 дней отдыхала и - снова лечилась. Впоследствии увеличила "норму" сока чистотела до 1 десертной ложки. Таким вот образом вылечилась.

Второй совет для тех, у кого проблемы с суставами. Нужно взять в равных частях порошок сухой горчицы, авиационный керосин, хлопковое масло. Все смешать. На ночь намазать (но не втирать!) этой смесью больные суставы и укутать их чистошерстной тканью.

... в освещении но- дили в отаплива-
... Ежедневно ра- дочки на трактор
... ало с песни: и разъехались
... мы чуть свет места.
... за другом вслед. С. Урынтаев
... ил путевку ет, что целина
... льский комитет. добровольцев
... друзья, обустройства б
... в дальние края. ли новые посел
... новоселами. называли в че
... и ты, и я". откуда сами р
... сняя стала своеоб- ский", "Киевс
... мном целинников. Обживали с

Тории, I

Троки Н

лины

... в один из мартов- строя жилье в
... й директор техни- самана и кам
... стюченко М. Н., Разворачивал
... Кабибуллин Г. А. и левые станы,
... Нургалиев М. Ж. торы жили с
... всех учащихся тех- до глубокой с
... сказали, что к нам сельское руко
... от первые добро- тивисты прово
... елинники, и что их зационно-мас
... имо достойно ту. Устраивали
... на железнодоро- вания среди т
... вокзале. В этот поощряя их ка
... лице было очень так и материа
... около 40 граду- прилюдно выд
... казалось, что все премии, грамот
... кие жители при- вывали их кул
... ечать доброволь- суг.
... площади перед На бескрай
... большая рабо просторах р
... нию новых зе

При заготовке
искиночь

- 1) Ширь и сахар
- 2) не перегревать
- 3) Внаклон не вѣз
- 3) Телесты поднимают
- 4) и вообще изиде труд
- искиночь
- Всего в
- много
- больше овощей и
- фруктов

не полагали, погребные ср-ва

Недриш - 587 1) мисва и почва берега
и мисва толокна

Недриш 589 2) мисва и вешенки

мисва недриш 661 Недриш - порок - се
погребн. куча огни

порок - кам. б. 714 Недриш - порок - се канавы
погреб.

порок кам. 597 -

порок 2 533
моханка 714

мисва недриш -
восток. почва и ее
моханка

порок
кошки { 910
607
715

порок
отсутствие 81 ринда

мисва 574
ушот 277

мисва недриш 607
при отлучении
порок

порок - 533, 716, 979.

и отсутствие 607

при переезде

1. Хвону наивой противона
2. Оморкее при илелонегр
3. Берез позки!
4. илель молонилеки

А. А. Семенов ~~Павел~~ ^{дочка}
защиты 1-я. Кинеско
Кинеско мешок 15.
и сорок сорок
мешок 1/2 сорок 3р.
песок голубой, мешок
капальцы.

Готинанобур - землевладелец
картонука
землеуслуга
от государства.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКЕ

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ

КАТИОНЫ

ЛИТИЙ	0,00018
НАТРИЙ	0,9963
КАЛИЙ	0,001
МАГНИЙ	0,0036
КАРБОНАТ НАТРИЯ	0,0611
ГИДРОКАРБОНАТ НАТРИЯ	1,6261
КАЛЬЦИЙ	0,0301
СТРОНЦИЙ	0,0002
ЖЕЛЕЗО	0,00061
МАРГАНЕЦ	0,00073

АНИОНЫ

ЦИНК	0,000151
МЕДЬ	0,00001
ХЛОР	0,3742
БРОМ	0,00366
ИОД	0,00116
СЕРА	0,0041
ФТОР	0,0297
ГИДРОФОСФАТ	0,000160
БОР, КРЕМНИЙ, ГАЗ-МЕТАН	
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ	+54°

В ИСТОЧНИКЕ ПОКАЗАНО ЛЕЧИТЬ

- **БОЛЕЗНИ СЕРДЦА** — кардиосклерозы, миокардические и атеросклеротические с легкой и средней степенью недостаточности кровообращения без приступов стенокардии.
- **БОЛЕЗНИ СОСУДОВ** — общий атеросклероз без резко выраженной гипертонии и атеросклероза аорты с легкой и средней степенью недостаточности кровообращения. Ранние периоды облитерирующего эндартериита, тромбофлебиты не ранее 8 месяцев после стихания острого периода. Трофические язвы голени.
- **ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДВИЖЕНИЯ** — хронические инфекционные полиартриты. Хронические обменные полиартриты. Деформирующие спондилезы в начальном периоде.
- **БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННЫХ ОРГАНОВ** — гипертиреозы, тиреотоксикозы 1-й стадии, гипопункция щитовидной железы. Воспаление яичников, хронических и острых.
- **БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ** — радикулиты, невриты травматического, инфекционного, аллергического и интоксикационного происхождения. Функциональные заболевания нервной системы: нерезко выраженные формы неврозов, астенические состояния, невротические реакции.
- **ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ** — хронические воспалительные

заболевания женской половой сферы: кольпиты, эндометриты, сальпингоофориты, параметриты, послеоперационные спайки. Климактерические неврозы.

- **КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ** — кожный зуд (печесуха), хроническая крапивница, нейродермиты, хронические экземы, псориаз, лишай.

ПРОТИВОПОКАЗАНО ЛЕЧИТЬ

Все острые заболевания, злокачественные новообразования, злокачественное малокровие, острые и другие кровотечения, острые почечные заболевания, туберкулез легких и других органов, стенокардия, стенозы, декомпенсированные пороки сердца, тахикардия, аритмия, бронхоэктазия, бронхиальная и сердечная астма, эмфизема легких, инфаркт миокарда, инсульт в прошлом, подострые заболевания сердца, разрушение (цирроз) печени, органические заболевания центральной нервной системы, душевнобольные: эпилепсия, шизофрения, маниакальные заболевания с галлюцинациями.

Воду не пей — вредно! Соблюдай правила!

Приезжающим иметь с собой документы: паспорт

, карту санаторно-курортного отбора.

Общий анализ крови и мочи. Рентгеноסקопию органов грудной клетки. Лечащимся с детьми иметь справку от сан. эпид. врача. Дети до 14 лет не допускаются.

Адрес источника: Краснодарский край, Белореченский район, село Великовечное. Железнодорожная станция Белореченская, Северо-Кавказской ж.д.



Лечебный Корпус



Душевые

Ренотропны Таби,
мь 3 мча

при сексуальге

(нарушение мозгово,
кровообращение)

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления по внедрению
новых лекарственных средств и медицин-
ской техники МЗ СССР

____ Э. А. БАБАЯН

22 апреля 1982 года

ИНСТРУКЦИЯ (листок—вкладыш)

По применению СИЛИБОРА (Siliboram)

Одобрена Фармакологическим комитетом
МЗ СССР

Силибор—сумма флаволигнанов, получае-
мых из плодов расторопши пятнистой (*Silibur
marianum*), семейства сложноцветных, в меди-
цинской практике используется в виде табле-
ток, покрытых оболочкой, оранжевого цвета.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Силибор оказывает гепатозащитное действие.
Препарат малотоксичен.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Силибор применяют при различных формах
гепатита и цирроза печени.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Силибор принимают внутрь до еды по 0,04—

—0,08 г 3 раза в день ежедневно.
Продолжительность лечения 1—2 месяца. Курс
лечения можно продлить до 3—6 месяцев или
повторить (через 1—2 месяца).

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

При применении силибора возможна аллергическая реакция (кожные высыпания, зуд и т. д.). В этих случаях следует уменьшить дозу или отменить препарат.

ФОРМА ВЫПУСКА

Силибор выпускают в таблетках, покрытых
оболочкой, по 0,04 г.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте.

Список Б.

Препарат отпускают по рецепту.

Харьков, тип. ПХФО „Здоровье“
зак. 4—160.000 19\I 1985 г.

Можно в сутки

1. Хлеб (25,0 гр) x 5 р
или макароны — по 2 ст. л x 5 р
или каша по 2 ст. л. x 5 р
(кроме риса и манки)
или картошка по 2 шт x 5 р

2. Молочное
2 стак. молока

3. Овощи
не сладкие, сколько хочешь,
сладкие — 300 гр (морковь,
свекла)

4. Фрукты все по 2 шт.
(кроме банана)

5. Жиры
растительные — 4 чайн. л.
или сливочное масло — 4 чайн. л.
или сметана — 4 ст. л. ложки

60 коп. Месо - 300 ч.

или рыба, или творог,

или сыр - 120-150 ч

или яйца (1 = 30,0 ч.)

Всё в древние времена, чтобы
избавиться от той или иной болезни,
люди искали средства в раститель-
ном мире. И находили их.

Примерно за 3 тыс. лет до нашей
эры в Китае уже было написано
книга о лекарствах растительного
происхождения.

В наше время, благодаря
беспрерывному развитию химии,
биохимии, фармакологии и др.
наук, всевозможные
изучены многие лекарственные
травы. Но чтобы успешно лечить
болезнь лекарственными
растениями, нужно знать точ-
ный диагноз и выбрать подхо-
дящее состав из трав.

Сейчас ^{уже достаточно} можно назвать
многие ~~некоторые~~ растения, которые
можно применять в лечеб-
ных целях в сборах при
заболеваниях почек и

моче выводящих путей.

Например, ~~мочегонное~~
~~действие~~ ~~оно~~ ~~зависит~~ ~~от~~ ~~корней~~
благородие содержащих в себе
эфирных масел, сапонина,
глюкозидов, кремниевой кислоты,
минеральных солей и др. веществ,
можно успешно применять
се как мочегонные ~~и противо~~
~~воспалительные~~ ~~при~~ ~~временно~~ ~~в~~
средства стимулирующие нравы:
корни стелющегося ^{мелко и мелко} ^и ^{растения} ^{на} ^{на}
и можжевельника, ^{растения} ^{растения} ^{растения} ^{растения}
местные и корни березы, хвощ
полевой, горец птичий (спорыш),
цветки бузины черной, редька
черная, репа, цветки василька,
листья ортосифона, листья
оружанки, ягоды и листья
земляники, корень лопуха,
стебли хвощика, старая
лекарственная крапива, ^{дубовая} ^{дубовая}
возлемя, корень солодки, плоды
ренжера (укропа), плоды аниса
обыкновенного, листья фенхеля,

тесно, смородина, корень солодки,
зенобарник, вероника, вереск,
ириска, брусника, ежевика,
гвоздика, оско, пестаная
хвощ полевой. и многие др.

А как против перечислен-
ные травы при остром
воспалении почек и мочевого
пути применять
противопоказано.

При воспалении мочевого
пути можно применять мочевые
выводящие, входящие в мочегонный
сбор, корень марены краси-
вой, все ^{корни} мочевые, много
можно применять в виде настоя,
но лучше их действие
оказывают они в сборах,
т. е. комбинациях этих
трав. ^{краткую} информацию
о составе сборов, их
пропорциях и времени
настаивания, изготовлении
и дозировке можно
получить в любой аптеке
или хороша.

Дурному не
всему же хорошему
зеленым, потому
корични, когда засыхают,
около дорог, в узеньких
сортиках
листья свежи 2/3 месяца
всего. и после этого

всего, а именно
сухо, у нас год
1 м ч и 2 нед,
первый

Wp

all

Антон мнн. вату

три новых кнел

за 1200. 80 руб. в том же виде

по 100-200 руб. 3р. в день

(4050) + , вату более мнн. пера мнн. 800

7/III 47

1) Сок одуванчика 1 ст. л.,
(цветы, листья, корни,
все пропустить $\frac{1}{2}$ через
сито) + мед
по 1 ст. л. 3-4 раза в день.
З/мед $\frac{1}{2}$ ст. л.,
все смешать и в холо-
дильник, хватит
этого состава и на
год. Капать по 1 ч.
2р в день. В меду

БИШОФИТ

ТУ 39-15-01-88

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

Хлор. магний	415—460 г/л
Бромистый магний	4—9 г/л
Сульфит кальция до	1 г/л
Хлорид кальция	4 г/л
Гидрокарбонат кальция	0,5 г/л
Хлорид калия	5 г/л
Хлорид натрия	5 г/л

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Вес

цена

руб.

коп.

Лечение сахарного диабета, гипертонии и атеросклероза.
Листья, ветви и молодые побеги тщательно промыть, нарезать, поместить растительный материал. И если в нем садовод или с другим салатом. Если сухие свежие клубни по 1-2 натощак. Сырые или сушеные клубни варить как картофель и есть по 1-2 шт. в день 2-3 раза. В день по: на 1,2 литра воды - два стакана клубней или 1 ст. ложки сухих. Сырые варить 10-15 мин, сухие около часа. Пить как чай или отвар, так и кореньев. Если нет диабета можно добавлять сахар и мед. Отвар снижает давление, сахар в крови, улучшает желчеотток на поджелудочную железу.

Рекомендуется делать сок из зеленой гречихи.
Сок едите в банку и храните в холодильнике. Через 10-12 дней 2 ст. ложки сока разбавите 2 ст. ложками воды и выпейте. Если пить ежедневно в течение года, излечиваются многие болезни, в т.ч. и туберкулез. Для восстановления сил рекомендуется пить чай из листьев и трав в следующем соотношении: листья гречихи 5 шт., молодые листья топинамбура (3-4 шт.) малины 2-3 веточки и мяты и мелиссы. Листья и ветви запаривают в керамическую посуду не менее 1 часа, настаивают с добавлением воды 10 мин.

Стакан такого отвара быстро снимает усталость.

Выведение солей из организма.

Взять 1-1,5 кг зеленой массы (листья и стебли) порезать на дольки, залить в 5-8 литровую кастрюлю, залить водой и кипятить 10-15 мин. Пропорции отвара разбавить водой в соотношении 1:5 по весу более 1:7. Если есть камни, то в этом растворе попарить 10-15 мин. Или в одной ванне попарить руки.

и ноги, а в другом посидите.
Готовы приготовить раптар для ванны из сырых
клубней, надо вымыть их не меньше 1кг. Детское
так же. Можно использовать и сухенные клубни
и листья. 300-400гр сухенной массы отваривать
40-45 мин и процедить. Из сухенных клубней
тоже можно делать ванны, но брать 100-150
гр. сухих клубней, которые варить 40-45 мин. Детям
на как прежде. Ванны можно принимать
как ежедневно, так и с перерывами 1-2 раз.

Повышает иммунитет.
Добавляйте в ванны
зая по 3-4 молодых
листьев, лучше
НИКОТИЯНОЗНОЕ
и вы избавитесь от
последствий облучения
и фтороза, и сахар (надо пить)

Аптека на урядках

Рвоты пять лет назад появилась у
меня гипертония и сахарный
диабет, и путь позже началось
отложение солей. Кровяное давление
поднималось до 240/120, сахар в кро-
ви доходил до 17,2. Сидел на диете.
Но истощился на свои диеты, по-
тому что кончался кончался в саду.

Решить пять лет назад начал сажать в
топинамбур - земляную грушу и
использовать в пищу, чтобы тем са-
мим друзьям не жалко, с чем ее едят.
Начал с того, что стал употреблять
своего краудин - в салатах, затем

супом и краудин, а потом варил
из них компоты. Потом делал
ванны с отварами из стеблей и ли-
стьев земляной груши. Через два
года регулярного употребления зем-
ляной груши у меня давление стало 140/80
а мне 64 года. Сахар в крови снизился
до 7,1. И отказался от диеты и ванн.
После 2х ванн из стеблей и листьев
земляной груши у меня ушли боли в
в коленных суставах. А еще после
двух ванн - стал бегать по лестнице
через год приняв для профилактики
еще 5 ванн. Ушли боли в ногах и ко-
чегонике, остались боли в сердце

Оказывающейся о слабых свойствах земли
груши известна давно. Еще академик
Вавилов предупреждает большое будущее
тытинамбуру. Он эффективен при сахар-
ном диабете, панкреатите, язвенной
болезни, мочекаменной болезни и инер-
тностной болезни. Попадая в орга-
низм, тытинамбур расщепляется на
ты, сахара, соли. В этой курорт-
ной воде содержатся витамины С и В, железо, фосфор.
Тытинамбур более утонченный, чем карто-
фель - каждый кусок даст по весу
В этой курортной воде содержится витамин
С и В, Fe, фосфор. Растение любит
солнце и не переносит увлажнения,
предпочитает песчаные почвы.
Размножается клубнями. Высаживают
до 40 клубну на расстоянии
12-15 см друг от друга. Заглубляют
земли 8-10 см. Курбур эта не
прихотливая. После всходов и роста
стеблей на 40 см оставить только
самый мощный. При достижении
1 м высоты внести в землю
изредка, обильно поливаю H_2O и
гуд 1-3 г на 1 м² почвы. Основная
работа заканчивается. При сухой
лете поливать гуд 20 дней.
Тытинамбур можно сажать в зиму
до заморозков почвы. Уборка -
после картофеля. Клубни очищают
и изредка высушивают. Стебли сушат
после измельчения.

Лечение проросшими зернами пшеницы

В течение нескольких лет, особенно впечатляющими были результаты большой группы детей с больными легкими, а также перенесших тяжелые заболевания.

Группа таких детей вместо медикаментозного лечения была подвергнута лечению с помощью проросшего зерна пшеницы. Эти дети до лечения имели очень плохой вид, были истощены, со скудно растущими волосами на голове, они имели вид старше своих лет, через несколько недель дополнительного питания проросшими зернами пшеницы, дети выглядели прекрасно, с пышными блестящими волосами, прекратился кариес зубов, который последующие 10 лет не наблюдался, выработался более стойкий иммунитет к простудным заболеваниям.

Я сама начала принимать проросшие зерна пшеницы в пищу на завтрак, когда мне было 64 года, через несколько месяцев мои волосы седые и редкие приобрели первоначальную окраску, стали эластичными, густыми. Зрение полностью восстановилось, когда мне уже 76 лет.

Таким образом, можно сказать, что положительное влияние проросшего зерна пшеницы на оздоровление человеческого организма очевидно.

Приготовление проросшей пшеницы в домашних условиях:

1. Взять 170-190 грамм пшеницы в стакане емкостью 200 см³ (доза на 3 дня)
2. Промыть от грязи в дуршлаке, пересыпать в глубокую миску или кастрюлю, промыть от шелухи и взвесить.
3. Рассыпать зерно слоем в 9-11 мм на широкую тарелку.
4. Залить зерно 70-80 см³ воды до такого уровня, когда верхние зерна наполовину находятся в воде. Лучше брать воду кипяченую или дистиллированную, охлажденную до комнатной температуры.
5. Накрывать тарелкой или эмалированной крышкой меньшего диаметра, поставить на шкаф в теплом месте помещения.
6. Через 1-1,5 суток утром снимается слой проросшего зерна с длиной отростков 0,5-1,5 мм. Сгребать можно ножом или ложкой, снять только 1/3 от всего объема, остальное оставить на дозревание.
7. Снятый слой пшеницы, порции 70-90 гр. в сыром виде промыть горячей кипяченной водой 70-80° в кружке или чашке емкостью 0,5 литра.
8. Промытую пшеницу залить горячим молоком 150-250 гр., добавить 1 чайную ложку меда (для целебной композиции), ложку сливочного масла для калорийности, сахар, соль по вкусу, через 10-15 минут можно съедать, тщательно разжевывая зёрна.
9. Оставшееся на тарелке зерно (двухсуточных порций) прорастает значительно быстрее, чем верхний слой. Поэтому вечером надо проверить степень её прорастания и при наличии ростков требуемых размеров, перенести тарелку в холодильник.
10. На следующий день снимается еще одна порция пшеницы, а оставшая ставится в холодильник или в шкаф, в зависимости от интенсивности прорастания.

Употреблять рекомендуется утром до завтрака или вместо завтрака.

Лучше использовать пшеницу яровую так как озимая прорастает значительно медленнее.

Вашему вниманию предлагается выдержка из доклада, отражающая результаты лечения, направленного на укрепление здоровья и омолаживания человеческого организма при помощи введения в его ежедневный рацион проросшего зерна пшеницы, специально приготовленного в виде киселя или каши.

В 1950 году была высказана мысль о Луккоконе-винамине "В", являющимся чрезвычайно важным стимулятором жизни, жизнедеятельности человеческого организма, в избытке содержащемся в зерне, так и в его оболочке содержится ряд других важных витаминов, различных ферментов и микроэлементов, необходимых для регуляции процессов всех клеток человеческого организма, а также укрепления всех клеток нервной системы.

Проведенная большая экспериментальная работа, полностью подтверждает эффективность стимулирующего действия проросшей пшеницы, природного животворящего эликсира жизни на координирование жизненно-важных процессов: оптимизацию объема веществ и стабилизацию нервной системы.

Во многих случаях результаты лечения серьезных заболеваний при введении в питательный рацион больных, превзошел самое смелое ожидания. Некоторые результаты были удивительными, а в ряде случаев невероятно, таки как восстановление цвета волос, густота волоса на о покрова головы, восстанавливалось зрение, координация движения, укрепление зубов и.т.п.

Как правило у лежащих больных любого возраста по моим наблюдениям, после приема в пищу пшеничного зерна через 1-2 недели наступало явное улучшение состояния здоровья, а затем полное излечение, характерно при этом - в дальнейшем ни наблюдалось почти полная невосприимчивость к простудным заболеваниям.

Особенно наглядными были случаи, когда медикаментозное лечение серьезных заболеваний хронического характера: туберкулез бронхиальных узлов, воспаление легких, язвы желудка и кишок, каменных образований в организме, экземы и.т.п. практически не давали результатов, но после введения в питательный рацион пищи, приготовленной из проросших зерен пшеницы, наступило улучшение, а в дальнейшем и полное излечение.

ЖИДКИЙ БАЛЬЗАМ "КИМ"

Наилучшее средство первой помощи.

Верный ваш помощник везде и всегда: дома и на работе, в туристском походе, во время занятий спортом и т.д.

● Формула:

Эукалиптол	35 г
Ментол	39 г
Метила салицилат	4,3 г
Камфора	1,7 г
Ароматные добавки	100 мл

● Действие:

Антисептика легочно-бронхиальных путей, утоление боли, противозудь, местное обезболивание.

● Показания:

Средство применяется при простуде, болях головной боли, повреждениях в мышцах и суставах, сухожилий, в области живота, тошноте, поносе, зуде, укусах насекомых, ушибах.

● Способы применения и дозировка:

Понюхивание непосредственное или ингаляция, смазывание с массажем 2-3 раза в день.

● Внимание!

Наружное применение! Принимать вовнутрь запрещается! Избегать контакта Бальзама с глазами, ранами, и внутренней поверхностью органов.

Детям до 5 лет не назначается.

Прекратить применение при аллергиях.

Хранить от детей.

● Презентация и упаковка:

Флакончик 6 мл.

Плотно закрывать после применения.

Регистрировано №: 380-80-ГТР
Введены в товароборот в 1959



IXENDI LABORATORIES
THU BUC-VIET NAM

KIM LIQUID BALM

The most efficacious remedy for the first aid.

Your very friend at every time, at home, at work, while travelling, in sports.

● FORMULA:

Eucalyptol	35 g
Menthol	39 g
Methyl Salicylate	4,3 g
Camphor	1,7 g
Excipient perfumed sq. to make	100 ml

● PROPERTIES:

Broncho-pulmonary antiseptic, analgesic, antipruritic, local anesthetic.

● INDICATIONS:

Coryzas, chill, neuralgia, pains of muscles and joints, headaches, bruises, sprains, abdominal colic, nausea, car-sickness, pruritus, insect bites.

● DOSAGE AND ADMINISTRATION:

In inhalations and/or frictions followed or not by massages on the adequate area/areas 2-3 times daily (see drawings).

● PRECAUTIONS:

For external use, do not swallow.

Avoid contact with eyes, mucous membranes or wounds.

Do not use with young children under 5 years of age.

Discontinue use if excessive irritation of the skin develops.

Keep out of reach of children.

● PRESENTATION:

Vial of 6 ml.

Well recork after use.

Visa №: 380-80-TTP.

Be in trade in 1959.



● Средство применяется
при простуде
CHILL



● Болих головной боли
HEADACHES



● ПОМОЩЬ
CAR SICKNESS



● области живота
ABDOMINAL COLIC



● СУХОЖИЛЬЯ
SPRAINS



● УКУСЫ НАСЕКОМЫХ
INSECT BITES



● поврежденных в мышцах и суставах
PAINS OF MUSCLES AND JOINTS

● зуде
PRURITUS



22/12/04

Лечение: гережден

1 день 0,5 ст. сока картофеля
свежего за полчаса до еды.

2 день 0,5 ст. сока свежей капусты
за полчаса до еды.

пить строго по утрам 1 раз
в день в течение месяца
месяц перерыв и повторить
лечение. Лечь спать; езды,
рабочее состояние при
полноте и повышенной влажности.

Сулема

1) $\frac{1}{2}$ пшена-зерна по 1 метр воды
1ый день - 12 л.

2) 1,0 г. сулемы по 1 куб. водки + 0,25 л. спирта
Принимать после еды и хорошеи еды
3р. в день 2-3 капли раствора в 50,0 г. газ
после этого еще пить газ.

3) Для профилактики с-2 пить рр сулемы
по 1 капле 2 недели в году и чарангия
на влет.

сулема
стр 6,

Вал. Стей

Выпить 2б.

с 10 дневным перерыв

зе 30 минут после еды

всего 1,0 метр

III об.

стр 6/ 1 зерно тисно, сусенот на 0,5 ч. водни
 растворит и тисно на 1 ч. Зр. в ден со егор
 за 30 минута Вити 34-5 дубини

стр. 22/ сусенот 0,28
 без
 алох } по 0,5 ч.
 сусенот }
 100 м безрезнож

стр 4/3/ 0,1-1000
 0,01-1000
 0,001-1000
 0,0005-500
 стр 21/ 10% сусенот
 тисно по

по 5-10-15 кан
 за трае со егор

до 3 ч. дуст. вод
 или кинетична
 замед, нежно егор
 в денот тисно
 и прохладна
 тисно по 1 ч. 0,1 ч. Зр.
 в ден за трае со егор

1 тисно = 0,0015

1 ч. Зр в ден за трае
 трае со егор

100-100,0

1,0 10,0

0,1-1,0-20к.

0,120
 0,90

0100 120

0005

1 тисно 0005

5к = 0,02,5

10к = 0,05

~~САХАРА~~
~~САХАРА~~
~~САХАРА~~

на иголки, Носерилет Зр, КТО-СКОЛЬ
называют на ^{средние} 1-е. Воды, дует и,

1 кан. до Зр. в глаз

2 к. Зр до 25 кан. после еды и при
хорошо

обратно. Иерер 10 дней и пока
и негод. строю

с 1 кан. начинать пока этот мир не кончатся

Вам всем

01% пр. арии + др. Нас
1:6 Мира Виды Решет

И Зл. надо 1 дее. и. Зр. Зр. до 2005-50
Зол. до еды (до 10)

Наша
Мот. 2/3 селеный соломенный
закусыв. многого
затв. перезуривать

Вода, Марс, Вода
пропавшие, ешь
Безупречный
гидротермический
решет
суконный
серебряный
Дер.
Петр. Занимать

А. И. П.

но зр. по тч.
10 дней समयу кини перерыв

2/ Нмвз 200 перазвз т.е. возе
по 50 зр. в день перерыв кини
по мнѣ 3м-ца
коре

наконди
номе
16/10/05
0: 2р

1м. 1но кини, но

т.е. на табак. кини возе упрас
1р в день
натошо

✓

Вал. Степ

доу на 1. дит. воя

0,04 - 1000,0 по 1 ден. и

0004 - 1000 Зр. в день

00004 - 100. за 30 минут
после еды

1 метр вынуть 10 дней
перерыв.

потом еще 1 метр вынуть
и все. Получается 4 кубика

А до еды, из-за желудка
и перит болят.

на 4 угольных угля на печеное
и погубиле 0,04 сушки

в день получается прикорм

00004
3

00012

11/11/05. Павел - сестре

1 зерно как на ширке на 1. воя
(серка) дитя

или 1. сирке

по 1 ст. л. Зр. в день

за 30 минут до еды

она вытисе 1. и все

но у нее
раке не вы

Красный мухой
от гари

и модина 300
на него

И.И. ПУШКИН

раздел

И.И. ПУШКИН

И.И. ПУШКИН

И.И. ПУШКИН

1. Стаж сущ. мухоморе
 но та сущ
 78г. стаж в 1951 и
 15 и. 3р. 30 ед
 20 м

21 дек

но 05. сущ
 150. сущ сущ

Ордена Трудового Красного Знамени, Ленинградская типогра-
 фия № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького «Союзполи-
 графпрома» при Государственном комитете Совета Министров
 СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговле,
 Ленинград, Латынская ул., 26.
 Издательство «Мысль».
 117071, Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.
 Подписано в набор и печать 20 октября 1972 г. Формат бумаги
 60×90^{1/16}, № 3. Усл. печатных листов 24,6. Четко-издательских
 листов 28,64. Тираж 150 000 экз. А04646. Заказ № 660. Цена 73 коп.
 Редактор А. Г. Кокошко
 Младший редактор Н. А. Полякова
 Художественный редактор В. Ф. Наденко
 Технический редактор С. П. Лебедева
 Копректор М. Д. Трощакина

Капиталистический способ производства
 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ

150. сущ сущ
 150. сущ сущ

Это способ против катаракты

Делать все эти методы надо поочередно, тогда и достигается лучший результат. Первое - нужно вдуть сахарную пыль через трубочку в больной глаз. Будет небольшое покраснение, но оно через пять минут пройдет. Если появятся слезы - пугаться не надо. Это хороший обеззараживатель глаза. Делать эту процедуру надо раз в день в течение 3 месяцев (если надо, то и больше). Второй метод - в 1 чайной ложке сока лука репчатого растворить мумие, размером с рисовое зернышко. Капать в каждый глаз по 1 капле 3 раза в день. Еще сделать раствор сока лука с жидким медом (1:1), еще сок алоэ с медом, тоже 1:1. В общем, не давайте глазам расслабиться, и получите отличный результат. Через четыре месяца катаракта должна рассосаться.

... 21.00 - Сери-
"Страсти по-итальянски", 22.00
ф. "Жандарм в Нью-Йорке".
40 - "Түнгі жаңалықтар". 00.00 -
чные новости".

Первый канал Евразия. 6.00 -
канал "Доброе утро". 8.00 - Но-
ти. 8.05 - "Угадай мелодию". 8.30 -
иал "Земля любви, земля надеж-
9.15 - Сериал "Бедная Настя".
10 - Сериал "Близнецы". 16.00 -
юсти. 16.20 - Д. с. "Борьба за вы-
вание". 16.45 - Сериал "Близнецы".
10 - "Угадай мелодию". 18.00 - Но-
ти. 18.10 - "Большая стирка". 19.10
риал "Бедная Настя". 20.10 - Се-
л "Земля любви, земля надежды".
10 - "Время". 21.35 - Х. ф. "Кукла".
30 - Х. ф. "Война с соседями". 00.00
овости. 00.20 - Сериал "Государ-
енная граница".

05 - "Елден хабар". 18.15 -
рінші сынып". 18.30 - "Кешкі
ңалықтар". 19.10 - "Ақиқат
йы". 19.30 - Новости. 20.10 -
арламент". 20.40 - "Бар мен
қ". 21.45 - "Легенды дикого
евера". 23.20 - "Түнгі жаңалық-
р". 23.40 - "Новости". 00.00 - Се-
иал "Ка Ина - королева джунглей".

Первый канал Евразия. 6.00 -
елеканал "Доброе утро". 8.30 - "Уга-
й мелодию". 9.00 - Новости. 9.05 -
ериал "Земля любви, земля надеж-
". 9.50 - Сериал "Бедная Настя".
10.35 - Сериал "Близнецы". 16.00 -
овости. 16.20 - Д. с. "Борьба за вы-
ивание". 16.45 - Сериал "Близнецы".
17.30 - "Угадай мелодию". 18.00 - Но-
сти. 18.10 - "Человек и закон". 19.00
ериал "Бедная Настя". 19.50 - "Поле
дес". 21.00 - "Время". 21.35 - Х. ф.
теперь леди и джентльмены". 23.50
овости. 00.10 - Х. ф. "Кровавая

мозг через эти негемы
600,0 сова моз. не пошван

- 1) 2000 мего
2000 вина на гор.
сметив. в знае кастр, киметет
15-20 мин. публ на луб. и.
зрадо в злив. 30 30 мин до едн.
при едн. пелузка и раке или
2) 8500 г труга (2220) на 3 л вода
мудо не лоним траву, "преда"
30-40 г и 1 куб. и. хлебной соды
все это киметет в тев. ~ 120 со
и остывший ова мить как воду
каждый день систематически
г. Мозного горск

ное.

Уч.

Кр

Молоковцева при раке.

Три пониженной кислотности

1. Сок подорожника (антерный или своего приготовления)
2. Гага или Берушник - антерный / гага-березовый арибн
3. Фракция АСД №2! не №3!
4. Пломбажолуид - это сок подорожника антерный выкасухой в гранулах
5. Реней - корни наставать на спирте или водке и можно сок из листьев реней = лопуха

Гйчо, курор,
рыба, кисломо-
лочные продукты.

В день нужно
100г белковых
продуктов

При заводе погек
ограничить выход
кислородом
мощью
вещи

ДОЛГОЛЕТ

На все случаи жизни

От простудного и аллергического кашля. Смешайте 1 ч. ложку меда с 2 ст. ложками семян аниса и щепоткой соли. Залейте стаканом воды, доведите до кипения и процедите. Принимать взрослым по 2 ст. ложки каждые 2 часа.

При потливости ног и поражении грибком. В литре теплой воды разведите 4 ст. ложки соли и 6 капель йода. Держите ноги в растворе по 5-10 минут в день до полного выздоровления. ✓

При укусах насекомых. Смочите место укуса водой и посыпьте солью.

От бородавок. Сок хрена смешайте с поваренной солью в весовой пропорции 1:1 и втирайте каждый день.

При варикозном расширении вен. Морскую соль разведите водой до состояния кашицы, охладите до 0 градусов. Нанесите кашицу на марлю и наложите на «змейки» вен. Когда температуры тела и кашицы выровняются, марлю можно снимать. Делать лучше утром. ✓

Важно

Концентрация соли в гипертоническом растворе не должна превышать 10%, более крепкий рассол может разрушить капилляры.

От простуды. Накалите морскую или крупную каменную соль на сковороде и насыпьте в полотняный мешочек. Встаньте на мешочек, чтобы хорошенько прогреть стопы. Температура должна быть высокой, но терпимой.

Смешайте соль с горчицей и красным перцем, натрите этой смесью носки и наденьте их. Соль будет стимулировать рефлекторные точки на стопах, а перец с горчицей - согревать.

От пародонтоза и налета на зубах. Соль смешайте с медом в равных пропорциях, разотрите до растворения кристаллов. Пастой протрите зубы и медленно втирайте ее в десны. Применяйте это средство 1-2 раза в неделю.

При пищевых отравлениях. Выпейте несколько стаканов подсоленной воды. Соль будет препятствовать всасыванию токсинов в кровь.

При артрозе суставов рук и ног. Смешайте соль с речным песком в пропорции 1:1 и разогрейте на сковороде до горячего состояния. Далее пересыпьте в миску и закопайте в нее пальцы. Держите до остывания смеси.



100%-ный алт

сертификат

1 кг - 1300 тенге,

1 л - 1800 тенге, 3 л - 5000 тенге

8-777-637-60-97 Бе

ПОЛИКС

гарантия и качес

двери

(утепленные, неутепленные)

решетки заборы печи

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВ

МЕТАЛЛОКОНСТР

кованные изделия

ТД "Континент", 4-6, 2 эта

Т.: 3-16-36, 8-777-445

Бесплатная доставка



Российско-гурьевский
профиль

ПЛА

О

SON

ДВЕРИ, ВИТРАЖИ

ОТКОСЫ (наружные и внутрен

Т.: 3-30-48, 8-771-4

Качественное обслуживание в опт

Гарантия 10+ лет

Скидки!

ТД "Деко"

СВЕТОТЕХ

● **ЛАМПЫ** энергосберегающ.
светодиодные (Гарантия 3 года!)



ЭЛЕКТРО

● светильники,
● ночники, фон
● кабель, пров
● электросчет
и многое дру

2-03-33, 8-702

ОКНА ОТ

РЕЦЕПТ

Служебный адрес: г. Москва, аптека [REDACTED]
тел. [REDACTED]

Домашний адрес: г. Москва, [REDACTED]

Мне хотелось предложить ВАМ следующий рецепт:

Ментол-2,5гр., Новокаин-1,0гр., Анастезин-1,0гр., спирт 70%-100гр.

Как видите в нем нет ничего вредного и предложенный мною, врачем, поли-
линии, он пользуется успехом среди больных. Предлагаемое средство со-
вершенно уничтожает ГЕМОРОИ, для чего достаточно совершить такой туалет
два раза в день. Имеются примеры 18-ти летнего гемороя, у у которых
больных были с кровотечением, много молодых образований.

Пользуясь жидкостью, предлагаемой мною, у больных совершенно все исчезло
через два-три дня.

Я не встречала больных, которые излечивались бы свечами.
Свечи приносят больному облегчение, но они не удобны для применения. А
так как быстро тают и для пользования ими нужно лежачее положение,
особенно в летнее время свечи совершенно расплавляются от жары.

Мой же способ чист, удобен, рационален. Не надо бояться кратко-
временного жжения, даже приятно ибо больные ощущают теплоту.

Это средство против гемороя оправдано многими.

ДАЛЕЕ МОЕ СНАДОБЬЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО СНИМАЕТ БОЛЬ ЛЮБОГО
ХАРАКТЕРА.

Например при болезни РАДИКУЛИТОМ надо и смазать затилочную часть
всей позвоночника, поясницы и область таза по ходу седалищного нерва. Это
гарантирует успешное облегчение. Больных радикулитом, у которых имеются
отложения солей, оно не излечивает.

При болях в сердце с отдачей в плечо, при головных болях
следует окружность уха смазать два раза в день.

При сильной ангины можно добиться быстрого облегчения, смази-
вая область гортани от уха до уха.

Когда при погоде тинет руки или ноги, исключительно хорошо
потереться ватой смоченной этой жидкостью, хотя бы один раз в день.

Это средство незаменимое, особенно в годы пенсионных лет, когда ноги не повинуются. Для этого ступни ног и полоколение внешки достаточно смазать один раз в день, совершенно оживёт походка, становится молодой бодрой. Это оправдано многими.

А ВАС прошу испытать это средство на себе и Наших знакомых и сделать это средство общим достоянием. Многие сомневаются из-за сомне-
вающимся я хочу ответить следующее:

Я знаю больных, которые страдают на протяжении многих лет головными болями и не могут излечиться, принимая "тройчатку" и другие средства. Все это временно. Мое средство радикально и к нему не надо относиться иронически. Такие больные для снижения КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ принимают все возможные лекарства и при этом недовольны, результатом лечения. Это средство является прекрасным и радикальным от бессонницы.

Для этого надо потереть шею смоченной в этой жидкости ватой от уха до уха, в результате наступает прекрасный сон, не надо прибегать к доминалу и пр. снотворным, так как у больного вырабатывается привычка к ним и в конечном итоге появляется своего рода наркомания и кроме того, все эти снотворные при длительном употреблении притупают мозг, теряется память.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ СРЕДСТВО БЕЗВРЕДНО, ИМ СЛУДУЕТ ПРОТИРАТЬ ЛИШЬ
ШЕЮ ПЕРЕД СНОМ, ЛЕЧИТЬ НЕ МОЖЕМ МЫ, А ПРЕДЛОГАТЬ МОЖЕМ ЭТО
СРЕДСТВО СОВЕРШЕННО БЕЗВРЕДНО, СОВЕТУЕМ ВАМ ЕЩЕ РАЗ ИМ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ !

При гриппе

1) Аспирин (асцитил-сам. кишечка) ^{в день} 1х3 раза

2) Кальцекс по 1г.х3р.

4) Тетрациклин по 2г.х4р. интервал

если не полегает, то ^{в обед} пораньше
2таб. в обед 2таб. в 8г. 2г. 2г. 2г.

5) Сульфодимезин по 2г.х4р ^{8г. в. 2г.}
а если сульфодимезин (не пьет),
то 1ый день 2г. сразу
а в следующие дни по 1таб. в день
в один и тот же час.
если 1ый день тем 2таб. в 4г.аа дня
то и остальные дни уже по 1таб
в 4г.аа дня, каждый день так
в а если сульфадимезин - то

1ый день сразу ударная доза 5таб.
(если мучают в сердце скарлатина,
то 4таб. сразу)
а 2е дни в остальные дни

уже по 1таб. в день и тоже в
одни и те же часы.
Действие продолжается ровно 2г.аа

6) При гриппе обязательно
пить аскорб. к-ту
по 2г. 3р. можно по 1г. 3р.
только в чай, так не пить!!!

Старатель так раскрывает время
иногда, чтобы во время еды
тетрадь не принимать, а только
внимательно за 2 часа до еды или
2 часа после еды.

И все вышесказанное не пить. Интервал
делаю хотя бы 30-40 минут. А
то редкие пропуски и какое
использование новое в воле получить, да
еще и совет.

И каждый раз записывать темной
водой. Воды, набитые и надо пить
очень часто.

7) Вокруг носа смазать жир. звезды
руки. руки, чтобы в нос не
попадало и руки сразу помыть, с мылом,
чтобы в нос не попало

8) горчичники

9) переложено молоко жирное + $\frac{1}{2}$ г. л. соды
(после переложено молока с медом
не выводить)

Делов, но кн. е. Зр. в сел
го едо, в сел
2000 (срещу)
Нотен спазу 13 гн.
мрочн оу, $\frac{1}{3}$ став. +
фитъ томъ го едо, ^{всѣ}
объ рако

Чудо-года брусники

Листья брусники содержат гликозид-арбутин, который, пройдя ряд биохимических изменений в организме, выделяется почками в виде дезинфицирующего, антимикробного вещества гидрохинона. Арбутин также регулирует обмен ~~веществ~~ углеводов, снижает сахар в крови.

Листья брусники применяются при заболеваниях обмена веществ, сопровождающихся отложением солей: при мочекаменной болезни и моче-нефрите, при ревматизме, заболеваниях суставов, протекающих с изменениями их формы.

Для лечения готовят сборы.

1. Листья брусники, травы крапивы, семян льна берут поровну. Одну столовую ложку смеси заливает стаканом горячей воды и перемешивают на водяной бане 30 минут. Процеживают и пьют по 2 столовые ложки 3 раза в день.
2. Листья брусники, березы и корня одуванчика берут поровну. Столовую ложку смеси заливает стаканом горячей воды. Посуду с растительными сборами ставят в кастрюлю с кипящей водой, прогревают на слабом огне, настаивают 15 минут. Процеживают

и принимают по 2 столовые ложки
3 раза в день.

При отложении солей применяют
чай из листьев брусники.

Одну чайную ложку заливают
стаканом кипятка, настаивают
3-5 минут в плотно закрытой
посуде и пьют по стакану утром
и вечером вместо обычного чая.

Отвары и чай используются с лечеб-
ной целью при гастритах, в виде
полосканий при ангине и хроничес-
ком тонзиллите, стоматитах,
пародонтозе.

Ягод брусники применяют при
повышенной кислотности сосудов
и малых кровоснабжениях, при
гастритах с повышенной
кислотностью.

Чай из сушеных ягод или
свежие ягоды полезны при
целом ряде заболеваний почек.

СЕМЯ ТЫКВЫ (SEMEN CUCURBITAE)

Назначение. Применяют по назначению врача как противоглистное средство при ленточных глистах (бычий, свиной и карликовый цепни, широкий лентец и др.).

Способ употребления. За 2 дня до лечения больному ежедневно делают утром клизму, а накануне вечером дают солевое слабительное. В день лечения натошак ставят утром клизму. Семена тыквы очищают от кожуры, сохраняя серозеленую оболочку. 300 г семян (детям 75—150 г) растирают небольшими порциями в ступке. Последнюю порцию смывают 3 столовыми ложками воды. К растертым семенам прибавляют 100 г меда и перемешивают. Принимают всю смесь натошак, а через 3—4 ч принимают слабительное, затем через полчаса

независимо от действия кишечника ставят клизму. Принимать пищу можно после стула, вызванного клизмой или слабительным.

Форма выпуска. В пачках по 130 г.

Регистрационный номер 71/946/16.

ЧТО ТАКОЕ ПАРАТИТ?

В последнее время в городе появились случаи заболеваний среди детей эпидемическим паратитом.

Эпидемический паратит или заушница — инфекционное заболевание, вызываемое фильтрующимся вирусом, передаваемое преимущественно воздушно-капельным способом. Оно характеризуется типичным поражением околоушных желез, реже подчелюстных и подъязычных. Заболеваемость эпидемическим паратитом и восприимчивость к нему меньше, по сравнению с корью, коклюшем, ветряной оспой, коревой краснухой.

Чаще заболевают дети в возрасте от 5 до 15 лет, реже до 5 лет, редко в грудном возрасте. Заражение происходит от больного человека путем прямого контакта, воздушно-капельным способом, а также через предметы.

Дети, перенесшие эпидемический паратит, имеют стойкий иммунитет. Болезнь

начинается остро, с повышением температуры до 38—39 градусов и с опуханием околоушной железы с одной стороны (реже с обеих сторон). Появляется боль при глотании и жевании. Затем появляется отек клетчатки в окружности пораженных желез и лицо заболевшего ребенка получает характерный вид, от которого болезнь получила название «свинка». Кожа бледная, напряженная, блестящая, иногда краснота. Изменения в зеве незначительные. На 4—5-й день опухоль начинает спадать, температура ступенеобразно падает и к 8—10 дню болезнь заканчивается.

Заболевание эпидемическим паратитом чревато своими осложнениями.


Профилактика заключается в изоляции больного. Карантин для контактных — 3 недели.

При подозрении у ребенка эпидемического паратита надо обратиться за помощью к врачу.

С. ТЯН,
врач-педиатр.

Адрес редакции: Кустанайская обл., г. Лисаковск, 1 микрорайон

Газета выходит 2 раза в неделю: среда, пятница. Объем 0,5 газ.



УКРАИНСКАЯ ССР (Донецкая область). В производственном объединении «Ждановтяжмаш» освоено серийное производство железнодорожных цистерн грузоподъемностью 120 тонн каждая. Три таких большегрузных резервуара на колесах, которые сейчас проходят испытания, предназначены для эксплуатации на Байкало-Амурской магистрали.

В результате реконструкции вагоностроительного производства, которую намечено завершить в этой пятилетке, мощности по выпуску цистерн увеличатся в полтора раза.

На снимке: готовая продукция — цистерны разного назначения.

Фото Л. Самсонова (Фотохроника ТАСС).

КАЕТСЯ

очень отчетливо звучит, что погибли не только пять девочек. Не суждено жить их детям, которые могли бы родиться, их внукам, правнукам. «Аты-баты, шли солдаты...» — рассказ о молоденьких солдатах, которые заслоняют собой раненых товарищей — в деревне, куда не пропустили они врага, находилась госпиталь. У одних остались маленькие дети, у других — только младшие сестры да братья. И снова звучит та же трагическая нота — оборвались юные жизни, в один миг свершилось страшное и непоправимое. В этом главный ужас войны — она убивает без разбору, убивает молодых, здоровых,

сильных, которым бы жить да жить...

И еще одна мысль проходит через всю киноповесть. Ни один солдат не погиб напрасно. И подвиг их не забыть. Память жива. Алые гвоздики падают в снег, словно капли крови. Их принесли к месту гибели отцов дети, которые уже старше их. Кадры меняются — то на экране те, кому идти в свой последний бой, то их дети и близкие. Черты отцов угадываются в детях. И даже поговорки, привычки отцов живы в них. И порой кажется, что все те ребята, которые остановили танки, вот они, живы, лишь повзрослели на десяток лет. И само собой приходит в голову то, что, наверное, и хотели сказать создатели фильма.

Ценная, лекарственна.

Возможно, не каждый знает, что капуста, которую мы почти ежедневно употребляем в пищу, является ценным лекарственным растением.

В народной медицине разных стран капусту использовали при различных заболеваниях. Самое простое и распространенное применение имеют свежие листья, которые прикладывают к гнойным ранам и язвам, опухолям и нарывам, используются они также при воспалениях кожи, как ранозаживляющее при ожогах.

Сок из листьев применяют при туберкулезе (вместе с медом), при болезнях печени, водянке, зубной боли, при гастритах и язве желудка. Корни и кочерыжка — тоже хорошее средство при опухолях. Отвар семян употребляют при подагре, болях в суставах, как противоглистное и мочегонное средство.

Капуста огородная произошла от дикорастущего вида в результате многовековой селекции. Существует много разновидностей ее и сортов.

В медицинскую практику капуста была введена после того, как были открыты ее противоязвенные свойства.

Пить сок можно ежедневно до 6 стаканов. Хранить его более двух суток не рекомендуется.

Е. ПРИБЫТЬКО,
провизор аптеки № 90.

рабочего класса, всех трудящихся за претворение идеалов социализма в жизнь. Ленинизм — это марксизм эпохи империализма и пролетарских революций, эпохи крушения колониализма и победы национально-освободительного движения, эпохи перехода человечества от капитализма к социализму и строительства коммунистического общества.

Важно подчеркнуть верность нашей партии марксизму — ленинизму, показать ее решительную борьбу со всякими попытками его ревизии, дальнейшее творческое развитие КПСС, братскими коммунистическими и рабочими партиями революционной теории в соответствии с новыми историческими условиями и задачами, возникающими на различных этапах строительства социализма, коммунизма.

При подготовке к занятию по этому вопросу в зависимости от уровня знаний слушателей рекомендуется использовать статьи В. И. Ленина «Три источника и три составных части марксизма» (Полн. собр. соч. т. 23), «Исторические судьбы учения Карла Маркса» (там же), речь Л. И. Брежнева на открытии памятника В. И. Ленину в Кремле 2 ноября 1967 года (Ленинским курсом, т. 2), доклад Л. И. Брежнева «Дело Ленина живет и побеждает» (там же), речь Л. И. Брежнева на встрече с избирателями Бауманского избирательного округа г. Москвы 2 марта 1979 года (Политиздат

При оказании мнѣ 30+30 возко с маслом растит.
и не курить сегодня и завтрашней
у метод Клевенко. Курс лечения малярий
больше курить сиропов. Только 22 и 23
вышли 18 метров возки и 15 л. масла

Лечение рана с 1 по 3^{ий} день мнѣ и ку базона
уой день и на шатаю. 5. 6^{ой} день - и ку сороры, 7. 8. 9^{ой} день
и ку шибороккане и высе с этим мнѣ и ку
морские верки. На 10^{ой} день курс повторяет
и 5. и 3. и 4. (50.0 базона + 350.0 возко, только 8. и 9.
при + 60. не суживать, мнѣ по 2-3. и 3. в день за
за 1 час до еды)

Марьян Корень + 500 корня + 0.5 меда 10 суток стоять
при + 40. Корни не суживать. мнѣ по 30. и 40. кан.
3. в день за 30 минут до еды. Все возокные раны
настой при курсе разводит 1:3 возко.

Шатаю 12.0 суток травы + 0.5 возки в 1. и 2. сутки
+ 40. 5. суток стоять. по 1. и 2. и 3. и 4. и 5. и 6. и 7. и 8. и 9. и 10. и 11. и 12.
за 40 минут до еды.

Сорора 200.0 + 500.0 56. ешера, стоять 10 суток
по 10 кан. 3. в день, по 35 кан. за 40 минут до еды
2-3 раза кончить, еще + 150. ешера 56. стоять
2 недели. Нижний слой шатаю. убога приложить
только наружно (натирать).

Ар пошартий - Компрессы с алоэ. + мастику
300.0 селитры + 50.0 возко шатаю. 2. и 3. сутки
положить на мнѣ. Канцетный или поворот
ниже и бинтом привязать. 2. и 3. сутки
родники и темные. 2. и 3. сутки 2. и 3. сутки
Масло мнѣ головы. 2. и 3. сутки 2. и 3. сутки
и кан. 2. и 3. сутки. мнѣ и крашны и мнѣ
Компресс от ишар - 80.0 меда + 50.0 возко + 1. и 2.
солн. Желта. Перемешать. и делать компрессы
на ночь. 2. и 3. сутки, не снимать, походить на петлях
мнѣ 15. 2. и 3. сутки. Курс лечения 3. и 4. 3. в день
в полого

Мастоплатит. Душица зверобой, тысячел. пуротурник
тот Зр. в день. титъ вига мина. Майерет 2000 свечей
пожареть + 2 ст. л. 9% уксуса, раз мешать и накладывать
на грудь. 10 раз сделать.

Ревматизм - Мадурат мёдом, как компрессе
сверху перчатник, потом уксус. 9% пакет, затем вату
и чаша на ночь. Ночь ночью

1 ст. л. шиповника + 1 ст. л. паша. спирта + 1 ст. л. оденки
всепать в руки.

Лечение зубов 12^ю пер. кисти 12. л. Сидон
медовой мундир + 1 л. кипев. воды. колен. т. Затем
1 ст. л. этого р-ра + 1 л. кипев. воды и титъ по 1 ст.
и Зр. в день до 20. 30 минут. до еды. 8 титъ 3 м. до

при ангине 4 полоскать безвкус. рром сидон, ^{нужно}
3-5 раз в день полоскать

4 полоскать рром жемчуж. квасцов. На 1 стакан
жидкости квасцов на кончике ножа

Колеб. 1 стакан кедров. или прополиса + 1/2
г. л. Ошущен серы - порошок, хорошо раз мешать
и вынуть, затем смесью маслом с медом
тот Зр. в день 12. л. без верха. Протитъ вон
4 дня и укрепленье.

Д. у. н. (детский церебральный паралич) 3-4 ведра
хот. кедровый деготь. Редкой лесок жидкой
примесью, нагреть в ванну налить и
посидеть ребенка в одежде и не допускать
каши.

При ожогах. гуашин. жир

Шомеручонерия - зверобой 600 куркумы 120
тот 30 уксуса 400 крапива 1000 уксуса 120
и новник 200 хмель 500 ромашка 100
тот в день, 7 дн. отбих. Коре леден. 3 м. до
2 ст. л. смеси + 0.5 л. воды в термосе по 100
выпить до 3 уксуса

1) гангрена - В кастрюле кипит вода, отжата
вода и смесь соуса, промокнуть и уксусом

2. Давать 4-5 раз по несколько месяцев групп
на группу, обернуть пленкой, тряпками, теплым
мантием. Менее подвижны утром и вечером
Здесь и поза дорожные
Фруах шени, пашки от пашены вывели
наклевывало ханну река светом (через
мелководья. 2-3 недели все хорошо
Сурь вшив — нательть хозейт, мыло +
жирование, перемешать на треньку и приложить
кному гряди вычесо. 'новозимес' 2 недели +
вычесит.

Обес — перенос летит (отруби не тесно завожу)

Воспаление легких — помочь трава бужива
1ст. л. травы + 1л. воды 1 раз съедать, пить по желанию
сладким (2 раза в день)

от парива и отруби куле
Курок несомненно ^{старого} нательть на тире,
+ 3 синие ^{старого} жирования (нательть) + хоз. мыло
на терку, все хорошо перемешать, приложить
на ночь, и уже в вечер все той вытает,
позом быстро заживает.

Ринит — само курок несомненно встает
Зименский — Вакта 3х месяцев. 2л. л. травы
на 1 стакан кипятка. нательть 20 минут. пить
по 2ст. л. 3р. в день после еды. Припадки
реже становится. Ночью 10 дней, перерыв 10 дней
и опять пить 10 дней. Припадки становятся реже.
В погоду 1 раз, и 15г. 1 раз

Резент

отвар овса и отрубей, принимают отвар кукурузы,
рылец, мела, мякотины, пшеницы, бессмерт
сок герн реушки, милье бруснички,
субо мелушка и кинесетини

Ночью сок картошки, как мурты, по 1/2 стакана
напоишь, 3р. в день 30 дней ~~и~~ пить 30 дней
и олен. масло

3/ в 2-е ночи разбудило нас и дамо
ей вынуть 2-й л. Коньёна развез. слезным
гашем 181, так чтобы ребенку нетрудно было
глотать широкое. Ну, в это время около часа
чтобы накормить и напоить паразитов,
этих и она еще через полчаса или час
разбудила ребенка и дамо перен и поса-
дила на горшок с водой в 3-й раз.
Такую процедуру делаем 5 раз в первые
2 ночи. Из маленького ребенка мы того
не знаем. А на 3-ю ночь вышло огро-
мное количество остриц, мильеи, червей,
клубок и еще какие-то паразиты. А на
5-ю ночь вышло аскарид длиной в 15 см.
и эту процедуру нужно сделать еще через 10
дней, а затем еще через неделю и
дальше стало здорово, куда делась каприз-
ливость, апатия.

Лечить зуб

2-3 корня конского щавеля измельчить
неделю настаивать на водке 0,5 л. пить
по 1-й л. 3-4 раза в день. Кроме этого при-
нимать 3-й табл. анциструмина в неделю.
Купать морскую капусту. На ночь делать
сезонку из воды для зуб. Слизистая назо
несколько дней и зуб будет уменьшаться
это нужно повторять и принимать 2-й табл.
в неделю, потом 1-й табл. в неделю. Зуб был
вначале с голубиное яйцо, а потом через
от гриппа

раздавить 10-15 штук чеснока и + 1-й л. едкого
уксуса + 1-й л. меда. Всё это смешать, зашить
в тряпочку. Микстуры 3 принимать в 1-й раз
на ночь. Укутывать больного, пропотевает, и к утру
станет легче. Эти микстуры на себе испытаны,
+ оно 30-40.

отравление мышью повариться этим
 на 1 л. кипяченой воды + 8 г. 1 чайн. сахара +
 + 1 г. 1 чайн. + 1/2 г. соды пищевой. Смешать и пить
 в течение 6 ч. газом маленькими глотками и
 не кушать ничего. Все пройдет
 11/III 99г. рако поженски I керосин 1 литр
 туда горючий керосин
 постоит в течение
 10 дней и натереть
 больные суставы

1. Морщины корень
 2. Ревень
 3. Змеевик (раковые шейки)
 4. Черная саранка или поворотник мужской
 5. Золотой корень
 6. Мед 2 стакана
- Все это по пол стакана и залить медом в
 3 л. литр банку и + 1 л. спирта разведенного и
 поставить в теплое место на 45 дней и процедить
 и пить 1 чайн. 3 р. в день

II
 2 литра камыши + 2 л. воды поварить на слабом
 огне до готовности, остудить, + 500 г. меда +
 1 чайн. ложку водки и зернышко асепсы и пить
 по 50,0 г. 3 р. в день

Втирание

- I
- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Спирт 200 г или | трапной одеколоном |
| 2. Анисовый спирт | 100 г (на медо-заводе есть) |
| 3. Камфорный спирт | 150 г |
| 4. Тисовый керосин | 100 г |
| 5. Скипидар | 100 г |
| 6. Тихов. масло | 100 г |
- Все постоит 2-3 дня
 и втирать больные
 места
7. сернал и т. 1:10

II 1 чайн. л. меда + 1 чайн. л. сметаны + 1 чайн. л. масла подсолн.
 + 1 чайн. л. соды пищевой + 1 чайн. л. горчицы + 1 чайн. л. уксуса
 перемешать, постоит 3-4 дня и смазывать больные
 места. III Хорошо пропотеть в бане и натереть поваренной
 солью, пополам с хреном и + меда немного и солью
 и втирать в больные места.

при всах охотрозе. и пошарить
нагребть хрен (корень), на марле на
чисть и пропустить марлевой стороной
к бачке. массу не мешать 15
мин. меньше, чтобы не было охоты
снять, и сразу свернуть бачку с
двигателем. 3 дня злеать, 3 перевернуть,
и так 9 раз.

от червот

м. зайч. лед. укус по 1/2 стакана
тепл. кипяченой воды

натиратке начинать с лица кончая
позднейшей (рукой). 1 мн натират

От рака

0,5 л. сока ствало ренд
0,5 л. сок позоронного
+ масса меньше 0,5 л. не маж
и ~~закроить~~ ^{закроить} ~~в~~ ^{капной} ~~в~~ ^{первичной}
~~не 1 мн.~~ ~~потом~~ ~~в~~ ^{и в хекоз}
и мнть по 1/2 ст. и 3р в день до еды.
3а ~~позднее~~
и от гротин это пьет.

1. Суклеса 10%. В. д. Зр. до кра софс
2. 30,0 на 5000 см² и мид 5-10-15 к
при ошх в зруч и упиотн в рз
3. Рронт шир пообилит мид при
зв шел. и замс оухоме
4. сок перел
5. сок свемь 1см. д. Зр. гень
6. обемних маен
7. тистотел - травоповидные змчо
8. свемью перел мид 2см-го позрер
1см. д. Зр. вдем со его до земли!
9. пропорции не соль,
10. морковб. уровень не по помеще 12. л.
11. мелука зеленые, безземельный кохар
+ 0,5 метра водки (стел 2 метр в 1 смко
(по 1 см. д. Зр. 12. л. Зр. вдем мет.)
12. коротки мид по 25.30 кан Зр! в дем
13. ред-3.
14. фетов по 5-10 кан Зр. вдем
15. марковиро седущую по боца
16. при оухоме и затвердених мид серу
17. балезам при рахе
18. берез почки погостъ на водке
19. при ошх в клудке мид полденв
20. при зв шел. сенокос, берез почки и топар
заверивать и амть. почк. почк.
21. ред по 1 кан со 25 кан, погам назол
1 раз в день

облетку
через соровы
эту кошку 1:10 подсе. лав
каши
5 стаканов + 5 стакан. масла
сладкая 25 стакан
7 дней на воздух, баню
40 минут
прогнать, раскормить в ступке
замыть остатком масла
7 дней отлеж, прогнать
сметать, воз. в
мал. кастрюле.

У Для прекращения боли присоединялись
применявшиеся напаром из следующего
списки:

дубовой коры 50,0 гр., пастушьей сумки
20,0 гр., олеум - 30 гр., зелья водянкой
перца - 20 гр., крапивы 30 гр., марья-
ринок - 40 гр. - все на три стакана
воды, густой напар процеживают
и разбавляют кипяченой
на шесть недель полбосе спохомся
прекратится

У Цветы ульи (напар, а иногда
отвар - билинг) как один так и
в смеси с большим успехом
применяются также в народе
для промывки матки и влагали-
ща во время беременности.

(Название русское: ульи бесем-
тлик пестроты, уграинские
ульи пестроты, келун - витор
сухарик, безмелтники полбо'ви)

У Цветы докнуса (ульи буркун)
смешанные по равну с
травой центаврии и
цветами лимон. и маляки
целая полбосе зельи
Примен по 1/3 стакана
напар (из 1 столовой
ложки смеси на 1 стакан
воды) 6 раз в день в
течении 3-4 недель.

От бисси:

- 1) посная горсть травн зверовой,
дубовой кори, кориз крапивы,
корневищ ржановых пшени,
лещиков розн олеи, цветов
бессмертника неогннго, вербовой
кори, травн псекушкы сушкы,
кори ошотника сими
лва, травн ворьяного перу,
цветов конопликов.

Берут 4 горсти смеси
землевают 2-3 л воды и
кипятят 20 минут.

Процеживают в стакан, выли-
вают в кружку и горячим
сильно молочно выдерживают
в течение 10 минут
Пить ватманом 2 стакана
на день: утром и вечером

- 2) отвар следующего состава:
взятых корову по 20 гр.
Кедрового:
кори дуба, веток олеи,
цветов белон мухой крапивы,
цветов ромашки, лещиков,
розн, травн тмарины.
Кипят

При тех же условиях
новый ствар из коры берон:

1 галуню консерву ствар
на стакан воды, но 2
таких стаканов в день.

Олегоб

куча раке

1-2-3 и до 10 кан.

1 раз в день за 30 минут до еды
пить около 1 л
с молоком

2) 1 стакан желтка +

+ 1 стакан свиного жира
есть от голода

[illegible]

Очищается от и широким
и извешиваемым теоретическим
резко увеличивается отчасти общие
в в в результате и в
судебной системы. Значит
предупредительный и фарм
лимокардио, сенокардио
смерть, отразов. Различий
открытых, истреб. полев. от

Op	zab	ov	year
1	1	2	3
2	2	3	4
3	4	5	6
4	7	8	8
5	10	11	12
6	13	14	15
7	16	14	13
8	12	11	10
9	9	8	7
10	6	5	4
11	3	2	1
12	15	25	25
13	25	25	25

Dam built no 25 kar.
 no. 650 p with not on river 5 pp. 6 bl.

0, 5 to 100 gms. 10-20?

was 2 we eye up

frakes

no source

was 0.5 bag

no 20 Tm

H up

1 et some was frakes

was 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Применяя эти,
различные,
революции,
процусь.

15 утка 0.5 л.
Семидар
Челета. Фиксир.
разрезь из менее
кислоты и вносим
в скелетар из
20 дней настоять
в холодном месте,
сильно подернуть.

как молоко,
забел ружь
вклинит 2
её аканел еширѣ
всѣ переменить
и потовое
средство.
можно втирать,
или делать
припарки.

Голову стараго и ксиви молохон
сидзат на полгоа мн один год, замо-
таб голову, потон хороши промывъ
с хоз. мылом.

При б. бот кита нужно съестъ вилъ
масляноко мн 5-6-8-10 ст., пока
человек не будет хорошо кушать.

полчархри.

паритъ руки, ноги в ветках михты
с вугун воды, ветки, зонеритъ и
паритъ замину, затем рхитратъ
руки, ноги.

- 1) 2 недели в михте паритъ, 2 недели
- 2) в соленом рре.
- 3) можно натиратъ михтовым маслом
руки, ноги, но мов.

от полчархри

тампон с джетом вставлетъ (можно с маслом)

Но радио слышалось как один человек
с А-Аты, работает и контактирует НЛО.
По словам того когда человек сидит то
в неведомых просто дуре, ангелы и неважно
а 20.08.92 по радио говорили один
мужчина что когда задавал вопрос
одному "контактеру" (вorse Моманову
которого брани в корабле много вы-
шли), тот отвечал и в это время
мужчина его фотографировал и
на фотогр. от него было изобра-
жено то, в чем говорил Моманов
(как было внутри корабля
много мебели, мебели, и
которые он рассматривал).

УТВЕРЖДЕНО
Фармакологическим комитетом
МЗ СССР 19 июня 1968 г.
вместо инструкции 18.03.61 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению корвалолола

Корвалол — комбинированный препарат, содержащий этиловый эфир — бромизовалериановой кислоты — 2,00%, фенобарбитал — 2,00%, масло мятное — 0,14%, спирт — 50,52%, воду — 45,34%.

Это бесцветная прозрачная жидкость со специфическим запахом.

Препарат обладает успокаивающим спазмолитическим действием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Корвалол применяется при стенокардии, тахикардии, при вегетативных неврозах, спазмах кишечника, бессоннице, при гипертонической болезни (в ранних стадиях).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Препарат применяют внутрь 3 раза в день по 15—20 капель в воде или на сахаре. Доза, в случае необходимости (пароксизмальная тахикардия), может быть увеличена до 40—50 капель на прием.

ФОРМА ВЫПУСКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Корвалол выпускают во флаконах из оранжевого стекла по 15 и 20 мл.

Препарат следует хранить в хорошо закупоренных флаконах в прохладном месте.

при описании

1000 морей сур.
1000 ромаш
1000 всемир
1000 звезд

2/3 водороду

1. сур. 1. сур.

но 1 сур. аном. вод.
настроит

за 15 мин. золота

1/2 сур. аном.

а безвод
но все улитки

за 30 минут
но все в grow
не могут

~~30 кв~~

Смирн 70-5000

Сек анос 5000

35 лет. не поливает
неделю

мед 5000

судна 28

100 м. берег порек

80 35 метров Ню

неделю столб в
Пити уроч. лес
нито ксн и 3р

золот в день

до кра

АсД

35 лет
неудка

УТВЕРЖДЕНО:
Фармакологическим Комитетом
МЗ СССР 17 декабря 1966 г.
ЛИСТОВКА - ВКЛАДЫШ
ЛИНИМЕНТ СТРЕПТОЦИДА

Препарат представляет собой однородную массу сметанообразной консистенции, желтоватого цвета. Действующим веществом линимента является белый стрептоцид, который оказывает антибактериальное действие.

Применение

Линимент белого стрептоцида является эффективным средством для местного лечения инфицированных ран различной этиологии, ожогов I и II степени и других гнойно-воспалительных процессов. Препарат применяют также для профилактики нагноения при ранениях.

Линимент стрептоцида наносят непосредственно на рану или линиментом пропитывают тампоны, которые накладывают на раневую поверхность.

Препарат способствует более быстрому заживлению ран. Линимент стрептоцида не обладает раздражающим действием: не вызывает раздражения как самой раны, так и окружающих кожных покровов. Одновременно с наружным применением линимента при тяжелых гнойно-воспалительных процессах по назначению врача применяют внутрь стрептоцид или какой-либо другой антибактериальный препарат.

Препарат выпускают в стеклянных банках.

Хранить в темном месте при комнатной температуре.

Тип. пгт Оржика, з. 1202, т 500000, 8-86 г.

Иск. и. Губови. Замечо
круп. имеет 1 стокан.

Кобальтовый блан
но. медь о. 2не, прощадя
все это влест в крешу
у кнзку 1/2 ден.

21 малоко в т. е. в. б. в.
кнзрен ст. е. к. н. о.
не. ам. в. б. с. о. м. и. б. е.

мечу кизил, и зотот
боуанет не падитъ

Омст. не олово, леми
контъ дель ступ,
а леми не контъ дель
То оми омама

На все наконец
раз мейб. нелен
10 мит с травой.

ице до недр
наша риготизин

1. ице по внир

2. То до кнеи

3. риготизин

4. погечи. гад.

5. укроп

6. Ено доу

ице брусти ко

ице герни ку

кративо

неделно ице кративо

дружно неделно герни ку

ице неделно

брусти ку

Место сего рожи
Место все козлы
много и эти
номе 32 медень
перевы 2 медень
кусасть и знои в
фрук (не в колхозе)
а суродрутаме.
номе повторить

При обескрове, сейчас
натирать на ночь мочой, можно 2-3 раза
и мочу 1/2 стакана утром на тощак
Теплой мочой.

и 1 неделю пить мочу
и только через 3 недели вынуть мочу.
При простуде натирать ваткой ^{в носу} нос, рот,
можно горло полоскать, десна, язык,
язык, уши.

У всех раны, можно промывать, прикладывать
у при суставах. Задом. На втирать насухо
болевые места и мочу 1-2 раза в день.

Иртыш, тобы
было здорово, как
прорвется, приловить
пристань, салмины
кто и лес, кому
заключить. и за ночь
с как и не было
перво

и больше
но близки люди
сухо + целить
погода
хорошо, перемена
и все перемена